

Xéfuryl

NIFUROXAZIDE
200 mg

COMPOSITION

Nifuroxazole 200 mg
Excipients : saccharose, stéarate de magnésium, amidon de maïs, gélule.

Excipient à effet notoire : Saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATIONS

Gélules
Boîte de 28

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTINFECTIEUX INTESTINAL

(A : appareil digestif et métabolisme)

DANS QUEL CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans le traitement de la diarrhée aigüe d'origine infectueuse chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans. le traitement ne dispense pas de mesures diététiques et d'une réhydratation si elle est nécessaire.

ATTENTION !

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'antécédent de réaction allergique aux dérivés du nitrofurane.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Vous devez consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en l'absence d'amélioration au bout de 2 jours de traitement,
- en cas d'apparition de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche.

En effet ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

La prise de gélule est contre-indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce traitement est un complément des règles diététiques:

- * Se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée (la ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres).

* S'alimenter le temps de diarrhée,

- En excluant certains apports et particulièrement les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.

- En priviligeant les viandes grillées, le riz.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser la Nifuroxazole pendant la grossesse.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MEDICAMENT POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT A PARTIR DE 6 ANS

Adulte: 4 gélules par jour en 2 à 4 prises.

Enfant à partir de 6 ans : 3 à 4 gélules par jour en 2 à 4 prises

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avalez les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

EFFETS NON SOUHAITS ET GENANTS

CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

* Possibilité de réactions allergiques.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION

FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

A CONSERVER A UNE TEMPERATURE INFÉRIEURE A 30°C.

Fabriqué par :

BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef

CONSTANTINE 25200 - Algérie