

# Xavel 1%

Diazépam 20 ml

Solution buvable

Facon compte-gouttes

## Composition :

Diazépam ..... 0.20 gr

Excipients :QSP 20 ml

1 ml contient 32 gouttes correspondant à 10 mg de Diazépam.

Excipients à effet notoire : Alcool, Jaune orangé.

## Classe thérapeutique :

BENZODIAZEPINES (Anxiolytique)

## Indications thérapeutique :

Toutes formes et tous dosages :

- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes.
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage alcoolique.

Solution buvable :

- Chez l'enfant : Prévention des convulsions fébriles à l'occasion d'une fièvre lorsque la prévention est jugée nécessaire ou en présence de facteurs de risque de récidive.

## Contre indications :

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité connue aux benzodiazépines (très rares).
- Insuffisance respiratoire, apnée du sommeil, myasthénie.
- Insuffisance hépatique sévère (risque de survenue d'une encéphalopathie).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Mises en garde :

Un état de dépendance physique et psychique est favorisé par la durée du traitement, la dose, l'association à d'autre anxiolytiques ou hypnotiques ou à l'alcool. Cet état peut entraîner, à l'arrêt du traitement, un phénomène de sevrage (insomnie, maux de tête, douleurs musculaires, anxiété, irritabilité, agitation) l'arrêt progressif du traitement permet d'éviter ces effets.

Une amnésie antérograde est susceptible d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du diazépam.

## Précautions d'emploi :

Utiliser avec prudence en cas d'insuffisance respiratoire, insuffisance hépatique ou rénale (réduire éventuellement la posologie), antécédent de pharmacodépendance, l'alcoolisme ou d'autre dépendance médicamenteuse.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions médicamenteuses :

- Associations déconseillées : contraceptifs oraux (inactivation possible,utilisation déconseillée ou choisir une pilule à 50 ug d'éthinylestradiol avec contraception locale jusqu'à obtenir 2cycles sans spotting ni métrona-gies) , rétinoïdes ,alcool.

- Associations à utiliser avec précaution : acide folique, acide valproïque, anti-dépresseurs imipraminiques anti-vitamines K ciclosporine, corticostéroïdes, digitoxine et acétyldigitoxine, disopyramide, quinidiques,théophyline et dérivés.
- Associations à prendre en compte : bêta-bloquants à forte métabolisation hépatique, carbamazépine, autres médicaments dépresseurs du SNC méthotrexate, phénytoïne.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

## Grossesse et allaitement :

Grossesse :

A éviter sauf nécessité absolue au cours du premier trimestre et éviter les fortes doses au cours du troisième trimestre.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée pendant la période de lactation.

## Posologie et mode d'administration :

**Adulte :**

- En pratique courante : en moyenne 5 à 15 mg/j
- En psychiatrie : 20 à 40 mg/j
- Manifestations fonctionnelles et somatiques accompagnant l'anxiété : 5 à 20 mg/j

**\*chez le sujet âge en insuffisance rénal :**

Diminuer la posologie de moitié.

**Durée du traitement :**

Ne doit pas être supérieure de 4 à 12 semaines

**En cas de surdosage :**

Etat ébrieux, sommeil profond, coma, dépression respiratoire.

Le traitement antidote spécifique est le flumazénil avec surveillance des fonctions cardio-respiratoires.

**Effets indésirables :**

En rapport avec la posologie et la sensibilité individuelle :  
Somnolence, difficulté de concentration, hypotonie musculaire, sensation ébrieuse, amnésie, antérograde,plus rarement réaction paradoxale (irritabilité, agressivité, excitation, confusion, syndrome d'amnésie-automatisme, baisse de vigilance).

**SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

**Conservation :**

Ne pas dépasser LA DATE LIMITE d'utilisation figurant sur le conditionnement.

**NE JAMAIS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS.**

*Fabricant*

**BIOGALENIC**

*Zone industrielle zighoud Yousef  
25200 Constantine -Algérie*