

Vitamine A GL

Retinol

1500 UI/ml

Collyre

Voie Oculaire



Composition et présentation :

Composition pour 1 ml:
Retinol1500UI

Excipients :

Disodium phosphate dodecahydrate, Disodium edetate, Cremophor RH 40, glycérol, disodium phosphate dihydrate, benzalkonium chlorure, eau ppi.

Excipient à effet notoire :

Benzalkonium chlorure

Forme pharmaceutique :

collyre en solution

Classe pharmacothérapeutique :

Médicament à usage ophtalmique, à visée cicatrisante (S : organes sensoriels).

Indications :

- En cas de sécheresse importante de l'œil.
- En traitement d'appoint des troubles de la cicatrisation cornéenne.

Posologie :

Instiller 1 à 2 gouttes de collyre 3 à 6 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie ophtalmique.

Ne pas avaler. Ne pas injecter

Se laver soigneusement les mains.

Instiller le collyre en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

Contre indications :

-Antécédents d'allergie à l'un des constituants du collyre.

Mises en garde et Précautions d'emploi :

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Le collyre ne doit pas être administré en injection péri-ou intraoculaire.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

En cas d'aggravation des symptômes, la conduite à tenir doit être réévaluée.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Eviter le contact avec les lentilles de contact souples.

Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

Interactions médicamenteuses :

L'efficacité d'un collyre peut-être perturbée par l'instillation simultanée d'un autre collyre.

Grossesse et allaitement :

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et de l'allaitement. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre en solution. Dans ce cas il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'au retour de la vision normale.

Surdosage :

Un surdosage éventuel peut entraîner une aggravation des effets indésirables. En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique.

Les effets indésirables :

Quelques signes d'irritation (sensation de brûlure, grain de sable, démangeaison, picotement ou sensation de corps étranger) ont été rapportés.

Une réaction allergique locale à l'un des composants du médicament est possible.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Conservation :

Avant ouverture : à conserver au réfrigérateur (entre 2° C et 8°C) et à l'abri de la lumière.

Après première ouverture : à conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière. Ne pas conserver plus de 15 jours après l'ouverture du flacon.

Médicament enregistré n° :

065/17 K 078/18

Fabricant et conditionneur :

GENCOPHARM, zone industrielle, Rouiba, voie : C
-BP : 73 Alger -Algérie.

Détenteur de la DE :

GENERICLAB zone industrielle Rouiba, voie : C -BP :
73 Alger -Algérie.

Date de révision de la notice :

Novembre 2018.

