

VISCERALENE®

Tiémonium 20mg



FORME ET PRÉSENTATION

Viscéralène® 20 mg, suppositoire. Boîte de 10 suppositoires

COMPOSITION

Méthylsulfatedetiémonium 20mg

Excipients :

Glycérides hémisynthétiques solides ... qsp 1 suppositoire

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est un antispasmodique. Il est préconisé dans les douleurs des maladies digestives, biliaires, gynécologiques et des voies urinaires.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Glaucome (douleur aiguë du globe oculaire avec troubles de la vision),
- Difficultés pour uriner (troubles de la prostate ou de la vessie),
- Allaitement.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Prévenir votre médecin en cas de :

- Troubles de la prostate,
- Maladies graves du rein ou du foie,
- Troubles cardiaques,
- Troubles de la thyroïde,
- Bronchite chronique,
- Certaines maladies digestives.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient au

cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Les risques de troubles de la vision peuvent rendre dangereuse la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

Réservé à l'adulte. La posologie habituelle est de 1 à 2 suppositoires par jour. Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie rectale.

DUREE DU TRAITEMENT

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Sécheresse de la bouche,
- Epaisseissement des sécrétions bronchiques,
- Sécheresse de l'oeil, troubles de la vue,
- Troubles cardiaques,
- Constipation,
- Troubles urinaires,
- Enervement,
- Confusion mentale chez les personnes âgées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants

CONDITION DE DELIVRANCE

Liste II

DE N° : 00/10D 031/231

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Juin 2015





فيسير الان تيمونيوم 20 مخ

سائق أو مستخدم الآلات
احتمال اضطرابات في الرؤية قد تجعل السياقة أو استعمال
الآلات خطيرة.

كيف يستعمل هذا الدواء
المقادير:
مخصص للكبار، المقدار العادي هو تحميلة إلى تحميلتان
في 24 ساعة. في كل الحالات يجب التقيد بتوجيهات
الطبيب.

طريقة الاستعمال عن طريق الشرج مدة العلاج يجب التقيد بتوجيهات الطبيب.

التأثيرات الغير مرغوب فيها

كل مادة فعالة، يمكن لهذا الدواء أن يسبب، عند البعض من الأشخاص، تأثيرات غير مرغوب فيها:

- جفاف الفم.
- تكاثر في الإفرازات الشعبية.
- جفاف العين، اضطرابات في الرؤية.
- اضطرابات قلبية.
- إمساك.
- اضطرابات بولية.
- تهيج عصبي.
- إيهام عقلي عند المسنين.

يجب إلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي تأثير غير وارد في هذا المنشور

شروط الحفظ
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°C
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

شروط الاستطباب
II قائمة

شكل و تقديم تحميلات تحوي 20 مغ. عليه ذات 10 تحميلات

تيموفينيوم ميشيل سولفات 20 مغ
سواغ غليسيريد نصف تركيبي جامد ك.ل. تحميله واحدة
متى يستعمل هذا الدواء
إن هذا الدواء مضاد للتشنجات. يستعمل في آلام الأمراض
البطنية، المسالك البولية و التناسلية.

- ١- إن هذا الدواء لا يستعمل في الحالات التالية:
 - زرق العين
 - صعوبة في التبول (مرض غدة البروستاتة)
 - الرضاعية
 - في حالة شك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الإِحْرَاءَاتُ الْوَاجِبُ أَخْذُهَا أَثْنَاءِ الْاسْتِعْمَالِ

مِنِ الْفُرْضَوْيِيِّ أَنْ تَعْلَمُوا طَبِيبِكُمْ فِي الْحَالَاتِ التَّالِيَّةِ :

- اضطرابات في غدة البروستاتة
- مرض خطير في الكلى أو الكبد
- اضطرابات قلبية
- اضطرابات في الغدة الدرقية
- التهاب شعبي مزمن
- بعض الأمراض الهضمية

تفاعلات دوائية و تفاعلات أخرى
للتجنب من تفاعلات مع أدوية أخرى، يجب إبلاغ طبيبكم أو
الصيدلي بأي علاج تتناولونه.

الحمل أو الرضاعة: يجب تجنب هذا الدواء عند المرأة الحامل، إلا في حالة تعليمات مخالفة من طرف الطبيب.

الرضاعة: يجب تجنب تناول هذا الدواء عند المرضعة بصفة عامة، وفي حالة حمل أو، رضاعة، يجب دائماً استشارة طبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

