

## فیابک

100

50

- ٤- احتياطات خاصة للأطفال**

يجب فيابك اعتبارات خاصة للمرضى الذين يعانون من الطبيب إذا كان لديك مشاكل في الكلى أو الكبد. يقرر الطبيب أن يصف طبيب أو الصيدلي.

**٥- التفاعلات مع أدوية أخرى:**

للتداخلات المحتملة بين العديد من الأدوية ، يجب طبيب أو الصيدلي عن أي دواء خر قيد بالدوية المستخدمة لذبحة الصدرية.

ال حدوث حالات الطوارئ الطبية ، يجب إبلاغ الطبيب بذلك الفيابك . لا يأخذ فيابك مع أدوية أخرى إلا بوصفة طبية.

فيابك يمكن ان يؤدي الى ارتفاع هام في مفعول الأدوية المسممة بمشتقات التترات او مانحات او كسيد التترريك مثل تتريت الأميل». « تستخدم هذه الأدوية عادة في حالة الذبحة الصدرية (صدرية).

يجرب أحد فيابك اذا كنت تتناول هذه الأدوية .

اول مثبطات الأنزيم البروتيني خاصة لعلاج العدوى بغيروس نقص المناعة البشرية ، قد يحتاج الطبيب لهذه العلاج اذنى جرعة فيابك أي 25 بعض المرضى الذين يتناولون القمام هي اعراض نقص ضغط الدم الانتصاري ، هذا يعني انخفاض ضغط سريع الى الجلوس او الوقوف. شهد بعض المرضى هذه الاعراض عند فيابك مع

يحدث هذا عادة احتمال ظهور هذه ظاهرة يصل حد الأقصى في 04 فيابك والحد من احتمال ظهور هذه الاعراض يجب أن تتناول جرعة يومية مستمرة من مانع ألفا قبل فيابك طبيب قد بدأ العلاج مع فيابك 25

**٦- فيابك لا يوصف النساء :**

**٧- فيابك لا يوصف النساء :**

**٨- تأثيرات في القدرة على القيادة واستخدام المركبات :**

قد يسبب فيابك دوخة ويمكن أن يؤثر على الرؤية. قبل القيادة أو تشغيل الآلات ، عليك أن تعرف كيف تنتهي بفيابك.

**٩- تعليمات زيادة الجرعة :**

أخذ جرعة من فيابك أكثر مما يجب :

لا يجب أحد اعراض أكثر مما يجب .

**١٠- الإرشادات في حال نسيان أخذ جرعة أوزيد :**

يجب ضماعنة الجرعة لتعويض الجرعة المنسبة .

**١١- الآثار غير المرغوب فيها :**

مثل جميع الأدوية ، فيابك من المرجح أن يكون له آثار جانبية ، على الرغم من أن الجميع ليس لهاها . عادة ما تكون هذه التأثيرات خفيفة إلى معتدلة.

**١٢- الآثار الجانبية الشائعة جداً :**

- المداع أو احرار الوجه

- الآثار الجانبية :

- عسر الهضم ، الدوار

تأثيرات على الرؤية ( بما في ذلك عدم وضوح الرؤية .

**١٣- الآثار الجانبية شوغا :**

ـ القيء ، الحساسية ، الطفح الجلدي ، عيون محققة بالدم ، ألام العين ، في عين واحدة أو كلا العينين .

ـ الانخفاض أو فقدان الرؤية

ـ الانتحساق لفترات طويلة بعد أخذ فيابك أحيانا مؤلم ، إذا كان لديك مثل هذا الانتحساق الذي يستمر لأكثر من أربع ساعات يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور ، التعب ، ألم عضلي ، جفاف الفم ، وطنين .

**١٤- الآثار الجانبية الأخرى :**

- ارتفاع ضغط الدم ، انخفاض ضغط الدم ، اغماء ، السكتة الدماغية ، عدم انتظام دقات نوبة قلبية أو انخفاض مؤقت في تدفق الدم إلى أجزاء من معظم هؤلاء الرجال وليس كلهم يعانون من مشاكل في القلب قبل فيابك. ليس ، من الممكن تحديد ما إذا كانت هذه لها صلة مباشرة فيابك.

إذا كان لديك ألم في الصدر أثناء أو بعد ممارسة الجنس ، يجب أن لا تستخدم التترات ولكن يجب عليك الاتصال بالطبيب على الفور .

يمكن أن تظهر فيابك أكثر من مرة في اليوم.

أعلموا الطبيب أو الصيدلي عن أي اعراض جانبية غير مرغوب فيها لم يتم ذكرها في هذه

25

VIAREK® 50 μg + 12/25 N845 /447



مخابر بيكر، الجزائر.

م.ن، إضافة للدار البيضاء

# VIABEK®

## Citrate de Sildénafil

### Comprimés pelliculés sécables 50 mg et comprimés pelliculés 100 mg

#### 1- FORME ET PRÉSENTATION

VIABEK® 50 : Comprimés pelliculés sécables. Boîte de 2 ou de 8 comprimés.

VIABEK® 100 : Comprimés pelliculés. Boîte de 4 comprimés.

#### 2- COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

VIABEK® 50 :

Chaque comprimé pelliculé sécable contient:  
Sildénafil (sous forme de Citrate) ..... 50 mg

VIABEK® 100:

Chaque comprimé pelliculé contient:  
Sildénafil. (Sous forme Citrate) ..... 100 mg

Excipients:

Cellulose microcristalline, phosphate de calcium dibasique anhydre, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, opadry bleu (triglycérides à chaîne moyenne, polydextrose, maltodextrine, dioxyde de titane, hypromellose, talc, laque aluminique indigo-cormine) et le poly-éthylène glycol pour le viabek 100mg.

#### 3- CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

VIABEK® appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiésterase de type 5 (PDE5), utilisé dans le cas de dysfonctionnement érectile.

#### 4- INDICATIONS THERAPEUTIQUES

VIABEK® est indiqué dans le traitement des hommes présentant des troubles de l'érection, parfois appelé impuissance, ce qui correspond à l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection du pénis suffisante pour une activité sexuelle satisfaisante.

Une stimulation sexuelle est requise pour que Viabek® soit efficace.

Vous ne devez pas prendre VIABEK® si vous n'avez pas de troubles de l'érection.

Vous ne devez pas prendre VIABEK® si vous êtes une femme.

#### 5- POSOLOGIE

Voie orale

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est de 50 mg.

Vous devez prendre VIABEK® environ une heure avant une relation sexuelle.

Ayez le comprimé en entier, sans le mâcher, avec un peu d'eau.

**Si vous avez l'impression que l'effet du VIABEK® est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.**

VIABEK® vous aidera à avoir une érection uniquement si vous avez une stimulation sexuelle.

Le délai d'action de VIABEK® varie d'une personne à l'autre, il est normalement d'une demi-heure à une heure. Vous pouvez observer que VIABEK® agit plus lentement si vous le prenez lors d'un repas riche en graisses.

Si VIABEK® ne vous permet pas d'avoir une érection ou si votre érection n'est pas assez longue, pour vous permettre d'avoir un rapport sexuel complet, parlez-en à votre médecin.

**Vous ne devez pas prendre VIABEK plus d'une fois par jour.**

RESPECTEZ TOUJOURS LA POSOLOGIE INDIQUEE PAR VOTRE MEDECIN.

#### 6- CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais VIABEK, dans les cas suivants:

· Si vous prenez des médicaments contenant des dérivés nitrés ou des donneurs d'oxyde nitrique comme le nitrite d'amyle. Ces médicaments sont souvent utilisés pour le soulagement des crises d'angine de poitrine (ou angor). VIABEK® peut entraîner une diminution potentiellement dangereuse de votre pression artérielle. Prévenez votre médecin si vous prenez l'un de ces médicaments. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

· Si vous prenez l'un des médicaments appellés donneurs de monoxyde d'azote, comme le nitrite d'amyle, car cette association peut elle aussi entraîner une diminution potentiellement dangereuse de votre pression sanguine.

· Si vous êtes allergique (hypersensible) au sildénafil ou à l'un des autres composants contenus dans le VIABEK®.

· Si vous avez de graves problèmes cardiaques ou du foie.

· Si vous avez eu récemment un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque ou si votre pression sanguine est basse.

· Si vous souffrez de certaines maladies rares héréditaires des yeux (comme la rétinite pigmentaire).

· Si vous avez déjà présenté une perte de vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIA).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### 7- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPÉCIALES

Informez votre médecin

· Si vous avez une drépanocytose (anomalie des globules rouges), une leucémie (cancer des cellules sanguines), ou un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse)

· Si vous présentez une maladie ou déformation du pénis.

· Si vous avez des problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement si votre cœur peut tolérer le surcroît d'effort entraîné par l'activité sexuelle.

· Si vous souffrez actuellement d'un ulcère à l'estomac ou de troubles de la coagulation (tels que l'hémophilie).

· Si vous ressentez une diminution ou une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre VIABEK® et contactez immédiatement votre médecin.

Vous ne devez pas utiliser VIABEK® en même temps que tout autre traitement des troubles de l'érection.

**Précautions particulières pour les enfants**

VIABEK® ne doit pas être administré aux enfants.

**Considérations particulières pour les patients ayant des problèmes rénaux ou hépatiques**

Vous devez informer votre médecin si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut alors décider de vous prescrire une dose plus faible.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### 8- INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, notamment en cas d'association aux médicaments, utilisés pour l'angine de poitrine.

Dans l'éventualité d'une urgence médicale, vous devez informer la personne qui vous soigne que vous avez pris VIABEK®. Ne prenez pas VIABEK® en même temps que d'autres médicaments sauf si votre médecin vous l'indique.

VIABEK® peut entraîner une augmentation importante des effets des médicaments appelés dérivés nitrés et donneurs d'oxyde nitrique comme le nitrite d'amyle «poppers». Ils sont souvent utilisés en cas d'angine de poitrine (ou douleurs thoraciques).

Vous ne devez pas prendre VIABEK® si vous prenez ces médicaments.

Si vous prenez des antiprothésas, notamment pour le traitement d'une infection par le VIH, votre médecin pourrait être amené à débuter votre traitement par VIABEK® avec la dose la plus faible 25 mg.

Certains patients prenant un médicament alpha-bloquant pour le traitement d'une pression artérielle élevée ou de problèmes de prostate peuvent ressentir des vertiges ou des sensations d'ébriété lorsqu'ils se lèvent; ce sont les symptômes d'une hypotension orthostatique, c'est à dire d'une pression artérielle basse lors du passage

rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvés ces symptômes lorsqu'ils prenaient du VIABEK® avec des alpha-bloquants.

Ceci survient le plus souvent. La probabilité d'un tel phénomène est maximale dans les 4 heures suivant la prise de VAIBEK®. Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquant avant de débuter un traitement par VIABEK®. Votre médecin peut initier votre traitement par VIABEK® à une dose plus faible 25 mg.

#### 9- GROSSESSE ET ALLAITEMENT

VIABEK n'est pas indiqué chez la femme

#### 10- EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES OU A UTILISER DES MACHINES

VIABEK® peut entraîner des étourdissements et peut affecter la vision. Avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine, vous devez savoir comment vous réagissez sous VIABEK®.

#### 11- SYMPTOMES ET INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous avez pris plus de VIABEK que vous n'auriez dû:

Une dose supérieure à 100 mg n'augmentera pas l'efficacité du produit. Cependant cela provoquera une augmentation des effets indésirables et de leur sévérité.

*Ne prenez pas plus de comprimés que vous ne devez.*

#### 12-INSTRUCTIONS EN CAS D'OMISSION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES

Si vous oubliez de prendre VIABEK® : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### 13- EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, VIABEK est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Ces effets sont généralement légers à modérés.

*Effets indésirables très fréquents:*

- Maux de tête ou les rougeurs de la face.

*Effets indésirables fréquents:*

- Indigestion, sensations vertigineuses, nez bouché, palpitation ou les effets sur la vision (notamment trouble de la perception des couleurs, perception accrue de la lumière ou vision trouble), dyspepsie.

*Effets indésirables peu fréquents:*

- Vomissements, réactions allergiques, éruptions cutanées, yeux injectés de sang, douleurs aux yeux, accélération du rythme cardiaque ou saignement du nez, somnolence, hypoesthésie.
- Diminution ou perte de la vision partielle, soudaine, temporaire ou permanente, d'un œil ou des deux yeux.
- Erections prolongées parfois douloureuses après la prise du VIABEK®. Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter votre médecin immédiatement, douleurs thoraciques, fatigue, myalgie, bouche sèche, vertiges, acouphènes.

*Autres effets indésirables :*

- Hypertension, hypotension, accident vasculaire cérébral, battements de cœur irréguliers, douleurs thoraciques, mort subite, crise cardiaque ou diminution temporaire de l'apport de sang à certaines parties du cerveau. La plupart des ces hommes, mais pas tous avaient un problème cardiaque avant de prendre ce médicament. Il n'est pas possible de déterminer si ces événements étaient directement liés à VIABEK®.

Si vous avez des douleurs thoraciques pendant ou après un rapport sexuel, vous ne devez pas utiliser de dérivés nitrés mais vous devez contacter immédiatement votre médecin.

Des douleurs musculaires peuvent survenir si vous prenez VIABEK plus d'une fois par jour.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

#### 14- CONSERVATION :

A conserver dans l'emballage externe d'origine à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

#### Liste I

Médicament autorisé n° : VIABEK® 50mg : 12/25 N045 /447.

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :



Laboratoires BEKER, Algérie  
ZA, extension Dar El Beida, 16100, Alger