

## Composition :

Chaque 1 gramme de crème contient 20 mg de kétoconazole.

Excipients : sulfite de sodium (E222), polysorbate, alcool cétylique, alcool stéarylique, hydroxytoluène butylé (E321), monostéarate de sorbitan, myristate d'isopropyle, propylène glycol et eau purifiée.

Excipients à effet notoire : alcool cétylique, alcool stéarylique, hydroxytoluène butylé (E321) et propylène glycol.

## Propriétés pharmacologiques:

Ce médicament d'action locale est un antifongique de la famille des imidazolés.

## Indications :

Traitement topique des infections de la peau à dermatophyte, des candidoses cutanées, du pityriasis versicolor.

## Contre-indications :

Vavo® crème est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un de ses composants.

## Précautions d'emploi :

Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du candida).

Le faible taux d'absorption cutanée rend peu probable l'apparition d'effets systémiques. Cependant, sur une grande surface, sur une peau lésée et chez le nourrisson (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches) la prudence s'impose. L'emploi de couches occlusives est à proscrire.

## Mises en garde :

La sécurité et l'efficacité chez les enfants n'ont pas été établies.

Utilisation externe uniquement, ne pas avaler.

Pas d'utilisation ophtalmique.

Des réactions allergiques spécifiques peuvent être produites spécialement chez les patients asthmatiques.

En raison de la présence de l'hydroxytoluène butylé, risque d'eczéma de contact, irritation de la peau, des yeux et des muqueuses.

En raison de la présence de l'alcool cétylique et de l'alcool stéarylique, ce médicament peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations cutanées.

## Grossesse et allaitement :

Prudence doit être prise chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes.

## Interactions médicamenteuses :

Aucune interaction n'a été rapportée, toutefois, il faut déclarer à votre médecin l'utilisation de n'importe quel produit topique.

## Posologie et mode d'administration :

Nettoyer et sécher la surface affectée avant l'application de la crème.

Masser doucement une petite quantité de la crème sur la surface affectée. En général, une application par jour est suffisante. En fonction de la sévérité de l'infection, 2 applications par jour peuvent s'avérer nécessaires. La durée du traitement est fonction du type de micro-organisme et du siège de la mycose; à titre indicatif et pour les formes les plus fréquentes, elle est de :

- Mycoses de la peau glabre : 2 semaines ;
- Mycoses des grands plis : 2 semaines ;
- Pityriasis versicolor : 2 semaines ;
- Mycoses des pieds : 2 à 4 semaines ;
- Mycoses ayant résisté aux traitements antifongiques antérieurs : jusqu'à 6 semaines.

## Surdosage :

Aucune forme de surdosage n'a été déclarée.

## Effets indésirables :

Dans de rares cas, on peut observer une légère irritation ou une sensation de brûlure au lieu d'application. Un cas d'eczéma de contact a été rapporté.

## Conditions de conservation et de stockage :

Conserver à une température comprise entre (15-30) °C.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption ou si le produit montre des signes de détérioration.

## Présentation :

Vavo® 2% crème : tube de 15g.

## Liste I

Date de révision de la notice : 01/2012

Décision d'enregistrement N° : 11/07/0028/352

Vavo® est une marque déposée.

### Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

## Fabricant :

EL KENDI industrie du médicament

Siège : Haouch Kaouche N°2, villa N° 14, Dely Brahim - Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda - Alger.