

Trimébutine Biocare®

Trimébutine 100 mg, 200 mg,
comprimés pelliculés

COMPOSITION

Trimébutine maléate 100 mg
Trimébutine maléate 200 mg
Excipients : lactose monohydraté, amidon de maïs, glycolate de sodium, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, talc purifié, dioxyde de titane, polyéthylène glycol 6000, hydroxypropylméthylcellulose.
Excipients à effet notoire : lactose monohydraté 64.00 mg

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION

Boîte de 20 comprimés pelliculés à 100 mg (blanc).
Boîte de 30 comprimés pelliculés à 200 mg (blanc).

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

Antispasmodique musculotrope (Appareil digestif et métabolisme).

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans le traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à la trimébutine et/ou à l'un des autres composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, signalez systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladie héréditaire rares). Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

CONDUITE ET UTILISATION DES MACHINES

Sans objet

542/03/2013



GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : Il est préférable de ne pas utiliser la trimébutine au cours du 1er trimestre de la grossesse. En l'absence d'effet néfaste attendu pour la mère ou l'enfant, l'utilisation de la trimébutine au cours des 2e et 3e trimestres de la grossesse ne doit être envisagée que si nécessaire.

Allaitement : L'allaitement est possible lors d'un traitement par trimébutine.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.



COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT

Mode et voie d'administration

La posologie usuelle est de 300 mg/jour (soit 1 comprimé 3 fois par jour) et peut être augmentée exceptionnellement jusqu'à 600 mg/jour (soit 6 comprimés par jour). La durée d'utilisation recommandée est de 3 jours. En l'absence de tout signe d'alerte, la durée maximale d'utilisation sera de 7 jours. Le traitement par le comprimé à 200 mg doit être de courte durée.

SURDOSAGE

En cas de surdosage, un traitement symptomatique sera mis en œuvre.



EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tout principe actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :
Prurit, rash et éruption cutanée, ainsi que les manifestations d'hypersensibilité telles qu'urticaire et angioédème.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.



CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation.

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

LISTE II

Date de révision de la notice : Septembre 2014.

Trimébutine Biocare 100 mg: D.E Algérie n°: 13/10F051/293.

Trimébutine Biocare 200 mg: D.E Algérie n°: 15/10 F193/293.

Fabricant et détenteur de D.E: Les Laboratoires BIOCARE,
R.N.44 Sidi Kassi Ben M'Hidi El Taref - ALGÉRIE.

