

Trimébutine B

Trimébutine

200 mg

La substance active est :

Maléate de Trimébutine.....200 mg.

Les autres composants sont :

Q.s.p un comprimé.

1-QU'EST-CE QUE TRIMEBUTINE B 200 MG, COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé, boite de 30 comprimés.

Ce médicament est indiqué dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires de l'adulte. Il corrige les troubles du transit associés.

La présentation à 200 mg doit être réservée à l'adulte aux cas exceptionnels ou la posologie de 600 mg par jour est utile.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE

TRIMEBUTINE B 200 MG, COMPRIME?

Ne pas prendre TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé :

-si vous êtes hypersensible (allergique) au Maléate de Trimébutine ou à l'un des autres composants contenus dans TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé.

Prendre des précautions particulières avec TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé:

-En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

GROSSESSE :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

ALLAITEMENT :

L'allaitement est possible lors d'un traitement par ce médicament. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable :

Lactose

Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3-COMMENT PRENDRE TRIMEBUTINE B 200 MG, COMPRIME?

RESERVE A L'ADULTE

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

La posologie est un comprimé dosé à 200 mg 3 fois par jour.

Le traitement par TRIMEBUTINE B 200 mg doit être de courte durée.

Si vous avez l'impression que l'effet de TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé que vous n'auriez du :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4-QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, TRIMEBUTINE B 200 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables. Rares réactions cutanées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5-COMMENT CONSERVER TRIMEBUTINE B 200 MG, COMPRIME?

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne laissez ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Fabriqué par :

BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef

CONSTANTINE 25200 - Algérie