

TRIMEBUTINE B 100 mg

Maléate de trimébutine

COMPOSITION:

Maléate de trimébutine..... 100 mg
Excipients:lactose,hypromellose, croscarmellose, stéarate de magnésium QSP un comprimé .

FORME ET PRÉSENTATION:

Comprimés, boîte de 20.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE .

(A: Appareil digestif et métabolisme).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

Ce médicament est utilisé dans les douleurs des maladies digestives ou biliaires.

Il corrige les troubles du transit associés.

DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

Ne prenez jamais TRIMEBUTINE B 100 mg, comprimé si vous êtes allergique au maléate de trimébutine ou à l'un des autres constituants de ce médicament .

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin .

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

L'allaitement est possible lors d'un traitement par ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT (POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION):

Réservez à l'adulte, 1 comprimé, 3 fois par jour. Voie orale, comprimé à avaler avec un verre d'eau.

EN CAS DE SURDOSAGE ,CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS :

Comme tout produit actif, ce médicament peut chez certaines personnes entraîner des effets plus ou moins gênants : rares réactions cutanées.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien, tout effet non souhaité et gênant qui ne sera pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament est à conserver à une température inférieure à 25°C.

Fabriqué par : **BIOGALENIC**

Zone Industrielle Zighoud Youcef Constantine 25200 Algérie.