

Tégréto® 200mg

Tégréto® 400mg

Carbamazépine

Que contient TEGRETOL 200, comprimé sécable et TEGRETOL 400, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée ?

La substance active est :

Tégréto 200

Carbamazépine.....

Pour un comprimé sécable, 200mg

Tégréto 400 LP

Carbamazépine.....

Pour un comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, 400mg

Les excipients sont :

Tégréto 200

Silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, carboxymethyl cellulose sodique, stéarate de magnésium.....Pour un comprimé sécable.

Tégréto 400 LP

Cellulose microcristalline, carboxymethyl cellulose sodique, polyacrylate dispersion 30 pour cent, ethylcellulose dispersion aqueuse, talc, silice colloïdale anhydre, magnésium stéarates, eau purifiée.....Pour un comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

Excipients à effet naturel : saccharose

Qu'est-ce que Tégréto et quand doit-il être utilisé?

Tégréto est un médicament anticonvulsif dont le principe actif est la carbamazépine. Il est utilisé sur prescription médicale pour traiter les adultes et les enfants souffrant de crises de convulsion (épilepsie). Il est aussi utilisé pour le traitement de certaines affections des nerfs comme p. ex. la névralgie du trigume ou certaines affections psychiques (manie, psychoses maniaco-dépressives), ainsi que lors de troubles apparaissant pendant les cures de désintoxication alcoolique.

Quand Tégréto ne doit-il pas être utilisé?

Tégréto ne doit pas être utilisé en cas de réactions d'hypersensibilité (allergie) à la carbamazépine ou à des substances apparentées telles que l'oxcarbazépine (Tritégréto) par ex. ou à d'autres médicaments associés à des réactions d'hypersensibilité, comme par ex. des antidépresseurs tricycliques (p.ex. amitriptyline, imipramine).

Tégréto ne doit pas être pris non plus en cas de traitement de la dépression par certains médicaments appelés inhibiteur de la mono-amino-oxydase (MAO).

En présence de certaines autres maladies, vous ne pourrez prendre Tégréto qu'après un examen médical approfondi; c'est pourquoi il est important que vous informez votre médecin si vous souffrez ou avez souffert des maladies suivantes:

- troubles de la fonction cardiaque,
- anomalies de la formation des globules sanguins,
- maladie du foie ou des reins,
- crises d'épilepsie de type mixte,
- pression augmentée dans l'œil (glaucome),
- confusion mentale, agitation ou nervosité,
- réactions d'hypersensibilité à l'oxcarbazépine ou à d'autres médicaments,
- porphyrie,

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise/d'utilisation de Tégréto?

Consultez immédiatement votre médecin ou faites en sorte qu'une autre personne puisse le faire à votre place si vous constatez un ou plusieurs des effets indésirables ci-dessous, qui apparaissent occasionnellement ou rarement. Ils pourraient être le signe précoce d'une atteinte grave du sang, du foie, des reins ou d'autres organes et pourraient nécessiter l'intervention rapide du médecin:

- fièvre, maux de gorge, éruption cutanée, ulcérations dans la bouche, gonflement des ganglions,
- coloration foncée des urines,
- signes d'une forte réaction cutanée (p. ex. peau qui pèle, éruption),
- jaunissement de la peau ou du blanc de l'œil,
- gonflement des pieds, des cheveux ou des mollets,
- battements du cœur irréguliers, difficulté à respirer, douleurs dans la poitrine, perte de conscience,
- augmentation des convulsions, apparition d'hématomme suite à des chocs minimes
- maladie de l'œil (glaucome)

Des réactions indésirables cutanées/d'hypersensibilité – graves et moins graves – peuvent rarement apparaître sous traitement par Tégréto (en particulier durant les premiers mois de traitement). Ce risque peut être plus précisément évalué grâce à un examen sanguin spécifique effectué avant le début du traitement, surtout chez les patients européens, mais aussi chez les patients d'origine asiatique. Avant le début du traitement, vous devrez discuter de cet examen sanguin avec votre médecin traitant et l'effectuer. Il est important de souligner que des réactions indésirables cutanées pourront aussi apparaître malgré un examen sanguin négatif, et que, si les résultats sont positifs, les réactions indésirables n'apparaîtront pas forcément.

Protégez-vous des rayons du soleil pendant la durée de votre traitement.

Un petit nombre de patients traités par des anticonvulsifs comme Tégréto ont eu des idées d'autonomisation ou de suicide. Si vous deviez avoir de telles pensées n'importe quel moment de votre traitement par Tégréto, contactez immédiatement votre médecin. Informez également votre médecin si vous deviez subir une intervention chirurgicale, même si elle est sans gravité.

Interaction medicamenteuse et autres interactions:

Tégréto, comme les autres médicaments psycho-actifs, peut réduire la tolérance à l'alcool, c'est pourquoi il est recommandé de renoncer à la consommation d'alcool pendant le traitement avec Tégréto.

Ne consommez pas de pamphleousse et ne buvez pas de jus de pamphleousse, car ils peuvent renforcer les effets du Tégréto. Les autres jus de fruit sont sans effet. Les femmes qui prennent un traitement contraceptif par voie orale (pilule) en même temps que Tégréto, peuvent avoir des saignements en dehors des menstruations normales. L'efficacité de la pilule contraceptive peut être annulée, c'est pourquoi d'autres moyens de contraception devraient être utilisés en plus.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous avez une maladie des reins et vous prenez des médicaments pour baisser votre taux de sodium dans le sang, ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Tégréto peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Vous devez impérativement informer votre médecin lorsque vous êtes enceinte, si vous désirez l'être ou si vous allaitez. Pendant la grossesse ou l'allaitement, Tégréto ne doit être pris que sur ordre explicite du médecin.

Quel effet a Tégréto sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines?

Ce médicament peut affecter les réactions, l'aptitude à la conduite et l'aptitude à utiliser des outils ou des machines.

Comment utiliser Tégréto?

Tégréto ne doit être pris que sur avis du médecin. Observez scrupuleusement les indications du médecin concernant les doses à prendre.

La dose est fixée par votre médecin et sera différente selon la maladie dont vous souffrez, selon votre âge et la gravité de vos troubles.

Tégréto doit être pris pendant ou après les repas avec une boisson.

Tégréto 400mg ne pas mélanger les comprimés de Tégréto 400mg (qui s'ouvent entiers ou demi comprimé, selon le dosage qui vous est prescrit) et les avaler avec un peu de liquide. Il est très important que vous utilisez votre médicament régulièrement afin d'atteindre l'effet maximal et de limiter l'apparition d'effets indésirables.

Si vous avez oublié de prendre une dose de Tégréto, rattrapez ce retard dès que possible. Cependant s'il est temps de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée, mais continuez avec la dose suivante.

Si vous n'avez pas pris votre médicament plusieurs fois de suite, consultez votre médecin. Pour le traitement d'une névralgie du trigume, la dose quotidienne maximale est de 1200 mg. Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Tégréto peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation du Tégréto peut provoquer les effets secondaires suivants:

les effets indésirables les plus fréquents sont: baisse du nombre des leucocytes dans le sang, vertiges, difficulté de coordination des mouvements, somnolence, nausées, vomissements, réactions cutanées allergiques, démagénosies, épistaxis.

les effets indésirables fréquents sont: baisse du nombre des eosinophiles et des plaquettes dans le sang, gonflement d'un organe (œdème), rétention de liquide, prise de poids; baisse de sodium dans le sang ayant conduit dans des cas isolés à une intoxication par l'eau accompagnée d'états d'irritation et de stagnation, maux de tête, confusion, anomalies neurologiques, convulsions, désorientation, diminution de la perception, troubles visuels, troubles de la conscience, sécheresse de la bouche, augmentation des phosphatases alcalines. Occasionnellement: mouvements involontaires anormaux, mouvement involontaire de l'œil, augmentation des transaminases.

Rarement: atteinte des ganglions lymphatiques, syndrome d'hypersensibilité (DRESS) avec fièvre, éruption cutanée, inflammation des vaisseaux sanguins, douleurs articulaires, baisse du nombre de leucocytes et des eosinophiles dans le sang, augmentation de volume du foie et de la rate ainsi que bilans hépatiques anormaux, syndrome de disfonction des voies. D'autres organes peuvent également être affectés (p. ex. poumons, reins, pancréas, myocarde, colon), carence en acide folique; perte d'appétit, hallucinations (visuelles ou acoustiques), dépression, nervosité, comportement agressif, agitation, confusion, mouvements anormaux, troubles de la parole, maladies neurologiques, fourmillements dans les mains et les pieds, paralysie, hypertension ou hypotension, douleurs abdominales, jaunisse, syndrome de disparition des voies biliaires, lipase erythémato-systémique, faiblesse musculaire.

Très rarement: augmentation du taux des leucocytes, des agranulocytes et des réticulocytes dans le sang, anémie, maladie sanguine, maladie auto-immune, réaction anaphylactique,

reaction grave secondaire à la prise de neuroleptiques, meningite, conjonctivite, troubles auditifs, troubles cardiaques (bradycardie, arythmies, bloc auriculo-ventriculaire avec syncope, insuffisance cardiaque, aggravation d'une coronaire), l'inflammation des veines sanguines, présence de callosum dans les artères, infarctus des vaisseaux sanguins, hypersensibilité au niveau pulmonaire se manifestant par fièvre/crépitation respiratoire, pneumonie, inflammation de la langue, de l'estomac, du pancréas et du foie, troubles hépatiques, sensibilité accrue à la peau et des yeux au soleil, ion de la peau, transpiration excessive, chute de cheveux, pilosité féminine anormale, troubles du métabolisme osseux, douleurs ou spasmes musculaires, troubles de la fonction, besoins fréquents d'uriner, rétention urinaire, troubles de la fonction sexuelle, augmentation de la pression oculaire, augmentation du taux de cholestérol, anomalies des tests de la fonction thyroïde.

Effets secondaires dont la fréquence est inconnue: réapparition d'une infection par le virus de l'hépatite, perte des ongles, fractures osseuses, diminution de la dureté osseuse et troubles de la mémoire, inflammation du côlon, une somnolence ou passivité.

Consultez votre médecin lorsque vous constatez que l'un des effets indésirables cités ci-dessus persiste pendant une très longue période.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Qui l'arrive-t-il si vous avez pris une dose forte? (Surdosage)

Si vous avez pris plus de TEGRETOL 200mg, comprimé sécable ou EGRETOL 400mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée que vous n'auriez dû.

Consultez immédiatement un médecin. Les signes d'intoxication se manifestent généralement au niveau des systèmes nerveux central (ex.: somnolence, agitation, hallucinations, troubles cardiaques, troubles de l'appareil respiratoire, troubles gastro-intestinaux, troubles musculaires et par les effets indésirables décrits sous «Effets indésirables».

A quoi faut-il encore faire attention?

Pendant la prise de Tégréto, protégez-vous d'un fort ensolleillement.

Conserver le médicament hors de la portée des enfants.

Les comprimés Tégréto 200mg doivent être conservés à l'abri de l'humidité et pas au-dessus de 25°C.

Les comprimés Tégréto 400mg doivent être conservés à l'abri de l'humidité et à température ambiante (15-25°C).

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Condition de livraison : Liste II uniquement sur ordonnance**Número d'autorisation**Comprimés à 200 mg : N°58/ 15A 004 / 068
Comprimés à 400 mg : N°57/ 15A 036/068

guthalterungsverordnung

Détenteur de la décision d'enregistrement :

Novartis Pharma Schweiz AG

Monbijoustrasse 118 3007 Bern, Suisse

Fabricant et conditionneur :

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131,

8005 Torre Annunziata, Italie

Date de mise à jour : Novembre 2014**NOVARTIS****Tegretol® 200mg****Tegretol® CR 400mg****Carbamazepine****Composition****Active substance: Carbamazepine****Excipients****Tablets: Sodium carboxymethyl cellulose (produced from genetically modified cotton), tabletting excipients****CR tablets: Tabletting excipients****Pharmaceutical form and quantity of active substance per unit****Tablets containing 200 carbamazepine.****CR tablets (scored, controlled-release, film-coated tablets) containing 400 mg carbamazepine.****Indications/Potential uses****Epilepsy**

- Partial seizures (simple or complex, with or without loss of consciousness), with or without secondary generalization.
- Generalized tonic-clonic seizures.
- Mixed forms of seizures.
- Tegretol is suitable for both monotherapy and combination therapy.
- Tegretol is not normally effective in absence (petit mal) or in myoclonic seizures (see "Warnings and precautions").
- Acute mania and maintenance treatment of bipolar affective disorders to prevent or attenuate recurrence.
- Alcohol-withdrawal syndrome.
- Idiopathic trigeminal neuralgia and trigeminal neuralgia secondary to multiple sclerosis (typical or atypical).
- Idiopathic glossopharyngeal neuralgia.

Dosage/Administration**Dosage in special clinical situations****Elderly patients**

Due to possible drug interactions and different antiepileptic drug pharmacokinetics, the dosage of Tegretol should be selected with caution in elderly patients.

An initial dose of 100 mg twice daily is recommended.

Patients who are potential carriers of the HLA-A*3101 allele because of their ancestry. Before initiating treatment with Tegretol it is recommended that patients at risk of certain adverse skin/hypersensitivity reactions because of their ancestry be tested for the presence of the HLA-A*3101 allele to improve risk assessment (see "Warnings and precautions").

Epilepsy

Tegretol should be prescribed as monotherapy whenever possible.

Treatment should be initiated with a low daily dosage, slowly increasing until an optimum effect is achieved.

Particularly in the case of combination therapy, the therapeutic dose should be based both on a determination of plasma levels and on efficacy. Experience has shown that therapeutic levels of carbamazepine lie between 4 and 12 µg/ml.

When Tegretol is added to existing antiepileptic therapy, this should be done gradually while maintaining, or if necessary adapting, the dosage of the other drug(s) (see "Interactions").

Adults**Oral forms: Initially 100-200 mg once or twice daily, slowly increasing until an optimum response is achieved – generally from 400 mg two or three times daily (corresponding to 800-1200 mg). In some patients, 1600 mg or even 2000 mg daily may be appropriate, although these high doses should be avoided due to a greater incidence of adverse effects.****Trigeminal neuralgia****The starting dose of 200-400 mg/day (in elderly patients, 100 mg twice daily) should be gradually increased until freedom from pain is achieved (normally with 200 mg three to four times daily). The dosage should then be gradually reduced to the lowest possible maintenance level. The maximum recommended dose is 1200 mg/day. When pain relief has been obtained, attempts should be made to gradually discontinue therapy, until another attack occurs.****Alcohol-withdrawal syndrome****Patients should be given 200 mg three to four times daily on the first two days of treatment. In severe cases, the dosage may be increased to 1200 mg/day during the first few days of treatment. The dosage should subsequently be reduced slowly, and treatment gradually withdrawn (see Discontinuation of treatment under "Warnings and precautions").****Acute mania and maintenance treatment of bipolar affective disorders****Dosage range: approx. 400-1600 mg daily. The normal daily dose is 400-600 mg, given in 2-3 divided doses. The dosage should be increased fairly rapidly in acute mania, whereas small increments are recommended for maintenance therapy of bipolar disorders to ensure optimal tolerability.****Further dosage instructions****the tablets may be taken – with liquid – during, after or between meals. The CR tablets (either a whole or, if so prescribed, half a tablet) should be swallowed unchewed with liquid.****CR tablets can normally be administered twice daily owing to the slow, controlled release of active substance from the tablets.****Switching dosage forms****• Switching from Tegretol tablets to Tegretol oral suspension: This should be done by giving the same daily dose, but in smaller, more frequent doses (e.g. oral suspension three times daily, instead of tablets twice daily).****• Switching from standard tablets to CR tablets: Clinical experience shows that the dosage may need to be increased in some patients.****• Switching patients from oral dosage forms to suppositories: The dose must be increased by approx. 25%; when switching to the suppositories. The maximum dose is 250 mg four times daily 6-8 hours intervals. Use of suppositories as a replacement for oral forms – when oral treatment of epilepsy is temporarily not possible (e.g. in unconscious or postoperative patients) – has thus far been limited to 7 days.****Contraindications****• Known hypersensitivity to carbamazepine and oxcarbazepine, to structurally related drugs (e.g. tricyclic antidepressants) or to any of the other components of the formulation.****• Patients with atrioventricular (AV) block, bone-marrow depression or a history of hepatic porphyria (e.g. acute intermittent porphyria, variegate porphyria, porphyria cutanea tarda).****• Use of Tegretol in combination with monoamine oxidase inhibitors (MAO inhibitors) is not recommended (see "Interactions"). MAO inhibitors should be discontinued a minimum of two weeks before initiating use of Tegretol – and even earlier if the clinical situation permits.**