

Composition :

Taloprex 10 mg : Chaque comprimé pelliculé contient de l'oxalate d'escitalopram équivalent à 10 mg d'escitalopram.

Excipients : cellulose, croscarmellose sodique, talc, stéarate de magnésium, SEPIFILM, dioxyde de titane.

Propriétés pharmacologiques :

Classe pharmacothérapeutique : antidépresseur/inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. L'absorption est presque totale et indépendante de la prise alimentaire. Le temps moyen pour atteindre la concentration maximale est de 4 heures après des doses répétées. La liaison aux protéines plasmatiques est inférieure à 80 % pour l'escitalopram et ses principaux métabolites. La demi-vie d'élimination après des doses répétées est d'environ 30 heures. L'escitalopram et ses métabolites majeurs semblent être éliminés par voie hépatique et par voie rénale. La majeure partie est éliminée sous forme de métabolites urinaires.

Indications :

- Traitement des épisodes dépressifs majeurs.
- Traitement du trouble panique avec ou sans agoraphobie.
- Traitement du trouble « anxiété sociale ».
- Traitement du trouble anxiété généralisée.
- Traitement des troubles obsessionnels compulsifs.

Contre-indications :

- Hypersensibilité à l'escitalopram ou à l'un des excipients.
- Inhibiteur de la monoamine oxydase non sélectif et irréversible (MAO).

Précaution d'emploi :

Le traitement doit être interrompu chez tout patient présentant des convulsions.

L'apparition de symptômes de sevrage lors de l'arrêt du traitement est fréquente, particulièrement si l'arrêt est brutal.

Mise en garde :

L'utilisation de Taloprex est déconseillée chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Aucun effet n'a été rapporté chez les patients recevant l'escitalopram. Cependant les patients doivent être informés que, très rarement, ont été rapportées des cas de somnolence susceptible d'affecter l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

Grossesse et allaitements :

L'utilisation de Taloprex pendant la grossesse n'est pas recommandée.

L'escitalopram est excrété dans le lait maternel ; par conséquent, l'utilisation de Taloprex n'est pas recommandée chez la femme qui allaite.

Interactions médicamenteuses :

Contre-indiquées : IMAO non sélectifs.

Déconseillées : Inhibiteur de la MAO-A sélectif et réversible (moclobémide).

Nécessitant des précautions d'emploi : sélegiline, médicaments sérotoninergiques (ex : tramadol, sumatriptan et autres triptans), médicaments abaissant le seuil épileptogène, lithium, tryptophane, millepertuis, anticoagulants oraux, alcool.

Posologie et mode d'administration :

La posologie usuelle est de 10 mg par jour. En fonction de la réponse thérapeutique individuelle, la posologie peut être augmentée jusqu'à 20 mg par jour, posologie maximale.

En cas de Trouble panique avec ou sans agoraphobie, d'insuffisance hépatique et chez les personnes de plus de 65ans : Une posologie initiale de 5 mg par jour est recommandée, avant une augmentation à 10 mg par jour.

La sécurité à des posologies supérieures à 20 mg par jour n'a pas été démontrée.

Taloprex® est administré en une seule prise journalière pendant les repas ou à distance de ceux-ci.

L'arrêt brutal doit être évité.

Surdosage :

Il n'existe pas d'antidote spécifique de l'escitalopram. Une ventilation et une oxygénation adéquates du patient doivent être instaurées. Le lavage gastrique et l'administration de charbon activé doivent être envisagés. Le lavage gastrique doit être effectué dès que possible après ingestion du médicament. La surveillance médicale portera sur les constantes vitales et sur la fonction cardiaque.

Effets indésirables :

Hallucinations, vertiges, somnolence, insomnie, hyperactivité psychomotrice, tachycardie, palpitations, douleur abdominale, nausée, vomissement, dyspepsie, diarrhée, augmentation des enzymes hépatiques, augmentation de la bilirubine, réactions d'hypersensibilité.

Consultez votre pharmacien ou votre médecin si un effet indésirable est observé.

Conditions de conservation et de stockage :

Conserver à une température comprise entre (15 - 30) °C.

Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le produit présente des signes visibles de détérioration.

Présentations :

Taloprex® 10mg comprimés pelliculés : Boîte de 30 comprimés.

Liste I

Date de révision de la notice : 06/2012

Décision d'enregistrement N° : 12/16A105/352

Taloprex® est une marque déposée

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Fabricant :

EL KENDI industrie du médicament

Siège : Haouch Kaouche N°2, villa N° 14, Dely Brahim – Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda – Alger.