



TAHOR® 40 mg

ATORVASTATINE
COMPRIMÉ PELLICULÉ

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit personnellement par votre médecin. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

● TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé

La substance active est : Atorvastatine (40,00 mg par comprimé) sous forme d'atorvastatine calcique trihydratée (43,38 mg par comprimé). Les autres composants sont : Carbonate de calcium, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, croscarmellose sodique, polysorbate 80, hydroxypropylcellulose, stéarate de magnésium.

Pelliculage : OPADRY blanc YS-1-7040 (hydroxypropylcellulose, macrogol 8000, dioxyde de titane, talc), émulsion anti-mousse (siméthicone, émulsofifants de stéarate, acide sorbique, eau), cire de cannelille.

● QU'EST-CE QUE TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un hypocholestérolémiant qui abaisse la quantité de cholestérol dans votre sang. Il est habituellement prescrit lorsque les activités physiques, la perte de poids et les modifications de votre régime alimentaire n'ont pas permis d'abaisser suffisamment ce taux de cholestérol.

Ce médicament est préconisé dans les hypercholestérolémies pures (types IIa) et mixtes (type IIb, III), lorsqu'un régime adapté et assidu s'est avéré insuffisant.

Ce médicament est également préconisé dans certaines formes d'hypercholestérolémies familiales en addition ou non à d'autres traitements.

Il est également indiqué en :

- Réduction des événements cardiaques chez des patients hypertendus traités avec 3 facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.
- Prévention des événements cardiaques et cérébrovasculaires chez des patients diabétiques de type 2 avec un autre facteur de risque, avec ou sans hyperlipidémie associée.

La poursuite du régime est toujours indispensable.

● INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé

CE MÉDICAMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS :

- allergie connue à l'un de ses composants (voir composition),
- affection hépatique en cours d'évolution, augmentation prolongée des enzymes du foie,
- en cas d'association à l'itraconazole, au kétaconazole (médicaments traitant certaines infections à champignons), au stiripentol (traitement de l'épilepsie), à la delavirdine (traitement d'une infection par le VIH) et à la télithromycine,
- chez la femme qui allait (cf. « Grossesse - allaitement »).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, en cas d'association à un autre médicament prescrit pour le cholestérol, un fibrate (cf. « Prise ou utilisation d'autres médicaments »).

● PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé

- Dans le traitement des hypercholestérolémies, le respect scrupuleux du régime alimentaire prescrit par le médecin est indispensable.
- Un bilan hépatique sera effectué avant traitement et régulièrement sous traitement.
- Si vous présentez l'un des symptômes suivants : douleur musculaire, crampes ou faiblesse musculaire, en particulier si elles s'accompagnent de malaise ou de fièvre : arrêtez de prendre TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé et consulter votre médecin immédiatement (cf. « Quels sont les effets indésirables éventuels »).
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Utiliser ce médicament AVEC PRÉCAUTION dans les cas suivants :

- Si vous consommez d'importantes quantités d'alcool ou si vous avez eu une maladie hépatique.
- Si vous avez des problèmes rénaux, une insuffisance en hormones thyroïdiennes, un antécédent personnel ou familial de maladie musculaire, si vous avez eu des problèmes musculaires lors d'un traitement précédent abaissant le taux de cholestérol (par exemple une autre « statine » ou un « fibrate »). Dans tous ces cas, votre médecin peut avoir besoin d'effectuer des analyses de sang avant et pendant votre traitement par TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes âgé de plus de 70 ans.
- La consommation de jus de pamplemousse doit être évitée.

● GROSSESSE

Ce médicament n'a pas d'indication pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, arrêtez le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

En cas de désir de grossesse ou si vous souhaitez allaiter votre enfant, prévenez votre médecin.

DEMANDEZ L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

● ALLAITEMENT

L'atorvastatine passant dans le lait maternel, ce traitement ne doit pas être utilisé si vous allaitez.

DEMANDEZ L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

● LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Lactose.

● PRISE OU UTILISATION D'AUTRES MÉDICAMENTS

VEUillez INDiquer A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU SI VOUS AVEZ PRIS RECENTEMENT UN AUTRE MÉDICAMENT MÊME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

Il est particulièrement important que votre médecin sache si vous prenez un fibrate (un autre médicament qui baisse le cholestérol sanguin), ou si vous êtes traité pour une infection due à un champignon ou au VIH, érythromycine, clarithromycine, cyclosporine, inhibiteur de la protéase, anticoagulants oraux et verapamil.

● COMMENT UTILISER TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé ?

La posologie usuelle est de 10 mg voire 20 mg par jour. Si nécessaire, la posologie peut être augmentée. La dose maximale recommandée est de 80 mg.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Voie orale.

A prendre en une seule fois (indifféremment avant, pendant ou après le repas).

En association avec le régime, ce médicament constitue un traitement devant être très prolongé et régulièrement surveillé. Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière, qui comporte des contrôles sanguins réguliers du cholestérol. Les enzymes du foie (transaminases) seront aussi surveillés régulièrement.

Si vous avez utilisé plus de TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé : il convient de poursuivre l'administration du produit à la dose prévue.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

● QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES ÉVENTUELS ?

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS

- Fréquents (plus d'un patient sur 100) : insomnie, céphalées, vertiges, diminution de la sensibilité cutanée, sensation de picotement, fourmillement, nausées, douleurs abdominales, digestion difficile, diarrhées, constipation, flatulences, éruption ou démangeaison au niveau de la peau, douleur musculaire, du dos ou des articulations, fatigue, douleurs au niveau du thorax ;
- Peu fréquents (entre 1 patient sur 100 et 1 patient sur 1000) : diminution du nombre de plaquettes dans le sang (thrombocytopénie), perte d'appétit, augmentation ou diminution du taux de sucre dans le sang, atteinte des nerfs des membres, perte de la mémoire, bourdonnements dans les oreilles et/ou la tête, vomissements, perte des cheveux, réaction allergique de type urticaire, impuissance, malaise, prise de poids ;
- Rares ou très rares (moins de 1 patient sur 1000) : œdème, atteinte du foie (hépatite, jaunisse, augmentation du taux des enzymes du foie) ou du pancréas, réactions cutanées sévères pouvant parfois se manifester par un brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique, éruption bulleuse, décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps, tendinopathies (atteinte des tendons) parfois compliquées de rupture de tendons, inflammation des muscles, douleurs ou crampes musculaires intenses qui, très rarement ont évolué vers une rhabdomyolyse (destruction des cellules musculaires).

Si vous ressentez des douleurs musculaires, une sensibilité musculaire ou une faiblesse musculaire, contactez immédiatement votre médecin car les problèmes musculaires peuvent être graves dans de rares cas.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

● COMMENT CONSERVER TAHOR 40 mg, comprimé pelliculé ?

A conserver à une température inférieure à 25°C

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur.

Liste I : Uniquelement sur ordonnance