

Tabeta®

Bétaméthasone



Composition :

Chaque 1g de pommade contient de la Bétaméthasone valérate équivalent à 1mg de Bétaméthasone.

Excipients : Paraffine douce blanche, Aerosil 200 et l'huile minérale.

Propriétés Pharmacologiques :

La Bétaméthasone est un corticostéroïde topique qui partage les actions anti-inflammatoires, antiprurigineuses et vasoconstrictrices.

Le mécanisme d'action n'est pas clair.

Il ya des raisons de croire qu'une corrélation reconnaissable existe entre la puissance du vasoconstricteur et l'efficacité thérapeutique chez l'homme. L'ampleur de l'absorption percutanée des corticostéroïdes topiques est déterminée par de nombreux facteurs, y compris le véhicule, l'intégrité de la barrière épidermique, et le recours à des pansements occlusifs.

Ils peuvent être absorbés par une peau intacte, cependant, l'inflammation de la peau et l'emploi de pansements occlusifs augmentent leur absorption percutanée.

Une fois absorbés, ils sont liés aux protéines plasmatiques à des degrés divers, principalement métabolisés dans le foie et sont ensuite excrétés par les reins.

Certains sont également excrétés dans la bile.

Indications :

Tabeta est indiquée dans les troubles cutanés, y compris, le psoriasis, l'eczéma atopique, l'eczéma infantile, l'eczéma de contact, l'eczéma nummulaire, prurit anal et valvaire, lichénification, névrodermite, la dermite de contact, la dermite séborrhéique, la dermatite exfoliative, dermatite solaire, dermite de stase, érythème polymorphe.

Contre-indications :

Tabeta est contre-indiquée chez les patients présentant une hypersensibilité connue à l'un de ses composants, dans le cas d'infections virales de la peau comme l'herpès simplex ou les infections cutanées bactériennes, fongiques ou parasitaires, de lésions ulcérées dues à la tuberculose, d'acné vulgaire, de rosacée, chez les enfants de moins de 1 an et qui présentent un érythème fessier et lors d'application sur les paupières car risque de glaucome.

Précautions d'emploi :

Des précautions d'emploi doivent être prises chez les femmes enceintes, les enfants de moins de 12 ans et lors de l'utilisation sur le visage.

Mises en garde :

Pour usage externe uniquement. L'usage ophtalmique n'est pas permis. Evitez une utilisation prolongée, surtout lors de l'application sur le visage.

Grossesse et allaitement :

- Grossesse :

Tabeta peut être prescrite pendant la grossesse si besoin.

- Allaitement :

Par voie locale, le passage transdermique et donc le risque d'excrétion du corticoïde dans le lait seront fonction de la surface traitée, du degré d'altération épidermique et de la durée du traitement.

Interactions médicamenteuses :

L'interaction avec d'autres médicaments n'a pas été signalée.

Posologie et mode d'administration :

Nettoyer et sécher la zone affectée avant d'appliquer le médicament.

Utilisée pour sécher les lésions squameuses de la peau. Appliquer une petite quantité, une à deux fois par jour.

Surdosage :

- Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

Du fait des caractéristiques du produit et de sa voie d'administration, la survenue de symptômes ou signes d'un surdosage en corticoïde est improbable. Cependant, une utilisation prolongée de corticoïdes topiques peut causer une suppression temporaire de l'axe hypothalamo-hypophysaire, provoquant une insuffisance suralénique secondaire.

- Les symptômes d'un hypercorticisme sont spontanément réversibles et leur traitement est symptomatique. Si nécessaire, rétablir la balance hydroélectrique. En cas de toxicité chronique, éliminer lentement le corticoïde de l'organisme.

Effets indésirables :

- Les effets indésirables suivants ont été signalés : des changements atrophiques de la peau tels que l'amincissement et la dilatation des vaisseaux sanguins superficiels, pigmentation, brûlure, picotements, démangeaisons, rougeur et atrophie.

- Consultez votre pharmacien ou votre médecin si un effet indésirable est observé.

Conditions de conservation :

Conserver à température comprise entre 15 et 30°C.

Ne pas utiliser au-delà de la date d'expiration ou si le produit présente un signe de détérioration.

Présentation :

Tabeta® pommade

Tubes de 15g

Liste I

Date de révision de la notice : 04/2011

Décision d'enregistrement N° : 09/07H165/352

Tabeta® est une marque déposée

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et le pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Fabricant :

EL KENDI Industrie du Médicament

Siège : Haouch Kaouch N°2, villa N° 14, Dely Brahim - Alger.

Usine : Z.A. Sidi Abdellah, Zéralda - Alger.