

SULPIRIDE LS[®]

Sulpiride 50 mg



FORMES ET PRÉSENTATIONS

Gélule, boîte de 30 sous plaquettes thermoformées

COMPOSITION

Sulpiride	50 mg
Excipients	q.s.p 1 gélule
Excipient à effet notoire	Lactose

QU'EST-CE QUE SULPIRIDE LS 50 ET QUAND EST-IL UTILISÉ?

C'est un neuroleptique qui appartient à la famille chimique des benzamides.

Il est utilisé dans :

- Traitement de certains troubles psychiques (schizophrénie, certains types de psychoses, troubles graves du comportement chez l'enfant),
- Traitement de courte durée de l'anxiété lorsque les traitements habituels sont insuffisants ou inefficaces.

QUAND SULPIRIDE LS 50 MG NE DOIT-IL PAS ÊTRE UTILISÉ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Phéochromocytome ;
- Tumeur stimulée par la sécrétion de prolactine (tumeur de l'hypophyse, cancer du sein...),
- En association avec le sultopride ou les médicaments dopamnergiques.

Attention : En cas de survenue d'une fièvre inexpliquée associée à une raideur musculaire, ne poursuivez pas le traitement sans avis médical: risque de syndrome malin des neuroleptiques.

Sauf cas exceptionnel, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de maladie de Parkinson.

Les situations favorisant les torsades de pointes doivent être signalées au médecin.

Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie, d'insuffisance rénale et chez la personne âgée, notamment en cas de tendance aux vertiges ou aux baisses de tension.

Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.

CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.

INTERACTIONS DU SUPIRIDE LS 50 MG AVEC D'AUTRES SUBSTANCES

Ce médicament ne doit pas être associé :

- Aux médicaments dopamnergiques (risque d'annulation de leurs effets); cette association peut néanmoins être nécessaire chez certaines personnes atteintes de maladie de Parkinson;
- Au sultopride: risque de troubles du rythme cardiaque graves.

Il peut interagir avec les médicaments susceptibles de provoquer des torsades de pointes.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un antihypertenseur ou un sédatif.

SULPIRIDE LS 50 MG PEUT-IL ÊTRE PRIS PENDANT

LA GROSSESSE OU L'ALLAITEMENT?

Grossesse : Si une grossesse survient pendant le traitement, consultez votre médecin: il appréciera le risque éventuel lié à l'utilisation de ce médicament dans votre cas.

Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire.

Allaitemt : Ce médicament passe dans le lait maternel : l'allaitement est déconseillé.

COMMENT UTILISER SULPIRIDE LS 50 MG ?

Mode d'emploi et posologie :

Voie orale. La posologie minimale efficace sera toujours recherchée. Si l'état clinique du patient le permet, le traitement sera instauré à dose faible, puis augmenté progressivement par paliers.

Adulte:

Traitement symptomatique de courte durée de l'anxiété de l'adulte en cas d'échec des thérapeutiques habituelles:

La posologie journalière est de 50 à 150 mg, soit une à trois gélules de SULPIRIDE LS 50 mg pendant 4 semaines au maximum.

Enfant de plus de 6 ans:

Troubles graves du comportement (agitation, automutilations, stéréotypies), notamment dans le cadre des syndromes autistiques :

La posologie journalière est de 5 à 10 mg/kg.

Conseils :

Dans le traitement de certains troubles psychiques, les neuroleptiques permettent de contrôler efficacement la maladie, mais une modification ou un arrêt intempestif du traitement expose à une rechute grave.

Une prise de poids peut être observée au cours du traitement. Une alimentation équilibrée, et si nécessaire les conseils d'un nutritionniste, peuvent prévenir et limiter ce phénomène.

QUELS EFFETS SECONDAIRES SULPIRIDE LS 50 MG PEUT-IL PROVOQUER?

Somnolence

- Mouvements involontaires ou inadaptés, tics, pouvant survenir lors de la première prise, en cas de surdosage ou, plus tardivement, lors d'un traitement prolongé.
- Raideur musculaire et difficultés à coordonner les mouvements.
- Augmentation de la sécrétion de prolactine pouvant se traduire par: absence des règles, augmentation du volume des seins, écoulement du lait par le mamelon et troubles sexuels.
- Prise de poids.
- Hypotension orthostatique.
- Rarement: troubles du rythme cardiaque (torsades de pointes), syndrome malin des neuroleptiques.

En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose ou de déficit en lactase.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

LISTE 1

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver SULPIRIDE LS 50 mg à température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine fermé et hors de la portée des enfants.

DE N° : 09/16D 066/231

Date de mise à jour de la notice : Novembre 2016





سو لبيريد ل س

سو لبيريد 50 مغ

هو الوحيد الذي ينصحكم بتناول أو عدم تناول هذا الدواء.
وإذا استلزم الأمر مواصلة هذا الدواء حتى الولادة يجب إخضاع المولود الجديد
إلى فحوصات طبية معمقة.
الرضاعه: يجب تجنب تناول هذا الدواء عند المرضعة لأنه يمر في حليب
الأم.

كيف يستعمل سولبيريد ل س 50 مغ

كيفية الاستعمال والمقادير
يؤخذ الدواء عن طريق الفم، المقدار الفعال الأدنى مستحب. ينصح بوصيف
جرعات خفيفة، ثم تزداد هذه الجرعات بالتدريج إذا كانت الحالة الصحية
للمربي تسمح بذلك.

عند البالغ

العلاج الظاهري قصير المدى لحالات التوتر عند البالغين في حالة فشل
التناول المعتاد المقادير اليومي 150 مغ أي من كبسولة إلى 3 كبسولات
مدة 4 أسابيع على الأكثر.

الأطفال فيما فوق 6 سنوات

اضطرابات حادة في السلوك، هيجان، حالات العنف الذاتي خاصة في إطار
تناول الانطواء. المقادير اليومي 5 إلى 10 مغ/كغم.

نصائح

عند معالجة بعض الأضطرابات النفسية، المهدئات العصبية، مضادات الذهان
تسمح بمراقبة فعالة للمرض لكن أي تغير أو توقف مفاجئ للعلاج قد
يعرض المريض لانهيار حاد. زيادة في الوزن قد تلاحظ أثناء العلاج لكن
تغذية متوازنة وفي حالة الضرورة استشارة مختص في التغذية تسمح
بالوقاية من الظاهرة.

الاعراض الجانبية سولبيريد ل س 50 مغ

- نعاس.
 - حركات غير إرادية ممكّن أن تتجه عنّه خاصة عند بداية العلاج أو
تناول جرعة زائدة أو تناوله لمدة طويلة.
 - تصلب عضلي.
 - ازدياد افرازات البرولاكتين وينجر عنها انقطاع الطمث، انتفاخ مع
سيلان الحليب منها و اضطرابات جنسية.
 - زيادة في الوزن.
 - نقص الضغط الشرياني.
 - نادراً اضطرابات في الوظيفة القلبية عدم إنتظام في نظام القلب
وتناول خبيث للمهدئات.
- بما أن الدواء يحتوي على الالكتوز فإنه لا ينصح به في حالات عدم تحمل
الالكتوز و حالات عدم امتصاص الغلوكوز والغالاكتوز و حالات نقص
الزئم الالكتاز.
- شروط الإستطباب**
فاندمة 1
- شروط الحفظ: يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون درجة حرارة 25°C.
لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مقر التسجيل رقم: 066/231
تاريخ تحدّيث النشرة: نوفمبر 2016

شكل و تقييم
كبسولات عابلة ب 30 كبسولة
التراكيب
سو لبيريد
سواع
سواع ذو تأثير ملحوظ
ما هو سولبيريد ل س 50 مغ و متى يستعمل

سو لبيريد ل س 50 مغ هو دواء مهدئ للأعصاب و ينتمي إلى عائلة
بنزاميد الكيميائية.

يستعمل سولبيريد ل س 50 مغ في:

- علاج بعض الأضطرابات النفسية (مرض انفصام الشخصية، بعض حالات النهان والاضطرابات السلوكية عند الأطفال).
- علاج قصير المدى في بعض حالات التوتر العصبي في حالة فشل أو عدم فعالية العلاج المعتاد.

متى لا يجب أن يستعمل سولبيريد ل س 50 مغ

لا يستعمل سولبيريد ل س 50 مغ في الحالات التالية:

- حمل كيس غدة الكظر.
- ورم يزداد مع افراز البرولاكتين (ورم في الغدة النخامية أو سرطان
الثدي).

إذا أخذ في نفس الوقت سولبيريد أو الأدوية الدويمينية.

تحذير:
عند ظهور حمى غير معروفة المصدر مع تصلب العضلات لا يمكن
مواصلة تعاطي الدواء بدون استشارة الطبيب (احتياط الاصابة بمرض
تاذر خبيث للمهدئات) إلا في حالات استثنائية هذا الدواء لا يمكن أن
يوصف لمرضى باركينسون. يجب إيقاف الطبيب في حالة عدم انتظام في
نظام القلب. يؤخذ هذا الدواء بحذر شديد عند مرضى الصرع، مرضى
القصور الكلوي و عند الأشخاص المسنين خاصة إذا كانوا معرضين للدوار
أو انخفاض في الضغط الدموي.
يجب الامتناع عن تناول الكحول: ارتفاع احتمال الشعور بالغثاء أو الغفوة.

سيادة المركبات واستعمال الآلات

قد يكون حاداً عند بعض ، هذا الدواء يمكن أن ينجر
عنه نعاس

الأشخاص خاصة مع تعاطي الكحول الأدوية المهدئة لذا فان استعمال بعض
الآلات منوع خاصة بعد أخذ الدواء مباشرة.

تدالخات سولبيريد ل س 50 مغ مع مواد أخرى

- لا يستعمل هذا الدواء مع: الأدوية لدواها مينية (احتياط الغاء مفعولها) لكن قد يكون هذا
التدخل لازماً عند بعض مرضى باركينسون.
- سولتوبيريد: احتياط حدوث اضطرابات قلبية خطيرة لأنه يستطيع
أن يتفاعل مع أدوية ياسطةاتها إحداث إضطراب قلبي.
يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتعاطوا أدوية إرتفاع ضغط الدم
أو الأدوية المهدئة.

هل يمكن تناول سولبيريد ل س 50 مغ أثناء فترة الحمل او
الرضاعه:

الحمل: في حالة اكتشاف حمل أثناء تعاطي هذا الدواء يجب استشارة الطبيب



حاملي مقر التسجيل، مصنوع، معين: مخابر سالم - م.ص.م. 19600 العلامة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر سالم

09/16D 066/231