

SPIRONOLONE

Spironolactone 75 mg

COMPOSITION :

Spironolactone micronisée 75 mg
Excipients : Q.s.p un comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé sécable, boîte de 30 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

DIURETIQUE EPARGNEUR POTASSIQUE
(C03DA01: système cardio-vasculaire).

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Ce médicament est un diurétique.

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'hypertension artérielle, le traitement des oedèmes, ainsi que dans d'autres indications.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

- * insuffisance rénale
- * insuffisance hépatique sévère
- * hyperkaliémie (quantité excessive de potassium dans le sang)
- * allergie à la spironolactone
- * en association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium, ou sels de potassium (excepté en cas d'hypokaliémie) (excepté si quantité insuffisante de potassium dans le sang).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en association avec le lithium (médicament du système nerveux), la ciclosporine, le tacrolimus (médicaments immunodépresseurs), certains médicaments destinés à faire baisser la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion), ainsi qu'en cas de grossesse et d'allaitement.

MISES EN GARDE SPECIALES

La surveillance de certains examens biologiques sanguins, en particulier la kaliémie, est indispensable chez les malades graves (et/ou en association avec un autre diurétique).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de diabète.
EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

L'association à d'autres diurétiques épargneurs de potassium et aux sels de potassium est contre-indiquée (excepté en cas d'hypokaliémie).

L'association à certains médicaments est déconseillée : en effet l'efficacité et la sécurité d'emplacement de la spironolactone peuvent être modifiées.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec le lithium, la ciclosporine le tacrolimus, certains médicaments destinés à baisser la pression artérielle (inhibiteurs de l'enzyme de conversion), IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne doit pas être administré pendant la grossesse et l'allaitement. Prévenir le médecin en cas de grossesse, de suspicion de grossesse et également en cas d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

SPORTIFS

Sportifs, attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS.
Lactose monohydraté.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

POSÉLOGIE

En règle générale, 1 à 2 comprimés par jour, cependant dans certaines circonstances, cette poséologie peut être augmentée jusqu'à 4 comprimés par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

1 à 2 administrations par jour.

DURÉE DU TRAITEMENT

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSE

En cas d'absorption massive, prévenir immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre anti-poison le plus proche.

Ce surdosage peut entraîner les malaises suivants: somnolance, nausées, vomissements, diarrhée.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÉNANTS (EFFETS INDESIRABLES)

- * tension mammaire
- * troubles des règles
- * impuissance
- * somnolence
- * éruption cutanée
- * troubles digestifs
- * crampes des membres inférieurs
- * possibilité d'augmentation de la kaliémie (potassium) dans le sang.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament est à conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Fabriqué par :

BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef

25200 CONSTANTINE - Algérie