

# SEPTHOL®

## GEL

### COMPOSITION:

pour 100 g	
Lévomenthol	0.520 g
Vératrol	0.250 g
Résorcinol	0.030 g
Acide salicylique	0.100 g
Excipients q.s.p	100 g

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Dermatologie

Traitements locaux pour les douleurs musculaires et articulaires

### UTILISATION

En application locale : en traitement d'appoint des traumatismes bénins « bleus, coups »

### CONTRE-INDICATIONS :

antécédents d'allergies aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des constituants.

Ne pas appliquer sur les yeux, sur une peau lésée quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

Enfant ayant des antécédents de convulsions dues à la fièvre ou non, en raison de la présence des dérivés terpéiques

Enfants de moins de 7 ans.

### MISES EN GARDE SPECIALES :

Ce médicament est réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 7 ans.

Cette spécialité contient des dérivés terpéiques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques, à type de convulsion chez l'enfant.

Ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée.

Ne pas appliquer sur une surface étendue du corps.

Respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demander conseil à votre médecin.

Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

Pour éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

### POSOLOGIE:

Adulte et enfant de plus de 7 ans :

1 application sur la zone douloureuse, 2 à 3 fois par jour.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, consultez votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de SEPTHOL Gel que vous n'auriez du : Rincer abondamment à l'eau

Si vous avez oublié de prendre SEPTHOL Gel : ne doublez pas la dose pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

Se laver les mains après application.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

Voie locale – ne pas avaler.

### EFFETS NON SOUHAITES:

Risque de réactions allergiques locales nécessitant l'ARRÊT DU TRAITEMENT.

Possibilité de rougeur cutanée au point d'application.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

En raison de la présence de dérivés terpéiques et en cas de non respect des doses, préconisées:

Risque de convulsions chez l'enfant,

Possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

### CONSERVATION:

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants

### PRÉSENTATION:

Tube de 50 g de Gel

D.E. n°: 09/21/F048/088

Fabriqué par:

**Laboratoires Pharmaghreb**

14125 Mellakou Tiaret.

Tél.: 046420240.

Fax: 046420205.

