

# Paracétamol® Sapramol 500 mg

## COMPOSITION :

Paracétamol.....500 mg  
Excipients: saccharose, povidone, benzoate de sodium, aspartam, acésulfame potassique, arôme orange, arôme masquant q.s.p. pour un sachet-dose de 2430mg

## FORME PHARMACEUTIQUE :

Poudre pour solution buvable en sachet - dose , boîte de 12.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTALGIQUE / ANTIPIRETIQUE (N.système nerveux central).

## INDICATIONS :

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et/ou des états fébriles , telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses.

Cette présentation est réservée à l'adulte et l'enfant à partir de 27 kg, soit environ à partir de 8 ans (cf. chapitre posologie).

Pour les enfants de moins de 27 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- 1- allergie connue au paracétamol,
- 2- maladie grave du foie.
- 3- Phénylcétonurie (en raison de la présence d'aspartam)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## MISES EN GARDES SPECIALES :

NE LAISSER PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Pour éviter un risque de surdosage , vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.

En raison de la présence de saccharose , ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose , de syndrome de mal absorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

-Si la douleur persiste plus de 5jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin

-Ce médicament contient 1,6 g de saccharose par sachet-dose : en tenir compte dans la ration journalière

-Ce médicament contient 7,76 mg de potassium par sachet-dose : en tenir compte dans la ration journalière.

## LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:

Aspartam ( source de phénylalanine)(E951), saccharose, potassium (7,76mg)

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Le paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin et de la glycémie. Signalez la prise de ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

## POSOLOGIE :

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (soit environ à partir de 8 ans).

- Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans):

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 3000 mg de paracétamol par jour , soit 6 sachets à 500 mg par jour.

La posologie usuelle est de 01 sachet à 500 mg , à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum

En cas de fièvre ou de douleur plus intenses :02 sachets à 500 mg à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum; sans dépasser 6 sachets par jour.

. Chez l'enfant , il est impératif de respecter les posologies définitives en fonction du poids de l'enfant et donc de choisir une présentation adaptée .

Les âges approximatifs en fonction du poids sont donnés à titre d'information.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60 mg/kg/jour, à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

La posologie usuelle est de :

- pour les enfants pesant entre 27 et 40 kg (environ 8 à 13 ans), la posologie est de 1sachet à 500 mg par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour.

- pour les enfants pesant entre 41 et 50 kg( environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1sachet à 500 mg par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 sachets par jour.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

## MODE D'ADMINISTRATION :

Voir orale

Verser le contenu du sachet dans un verre puis ajouter une petite quantité de boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruit). Remuer et boire immédiatement après.

## CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE :

L'intoxication est à craindre chez les sujets âgés et surtout chez les jeunes enfants (surdosage thérapeutique ou intoxication accidentelle fréquente ), chez qui elle peut être mortelle.

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN

Si vous avez oublié de prendre SAPRAMOL 500mg, poudre pour solution buvable en sachet dose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre

## EFFECTS INDESIRABLES :

- Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin , ont pu être observées: taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

- NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ OU GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

## CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

## FABRIQUÉ PAR :

FRATER Laboratoires  
51, rue Lazergui Kadour- SAOULA- Alger.

N° D.E. : 289/03B066/06