



RYNZA®

Poudre pour solution buvable.



FORME ET PRÉSENTATION :
Poudre pour solution buvable
Boîte de 5 sachets.



COMPOSITION :
Chaque sachet de 5 g contient :

Paracétamol 750 mg
Maléate de phéniramine 20 mg
Phényléphrine hydrochloride 10 mg
Caféine 30 mg

Excipients : acide citrique anhydre, saccharine sodique, citrate de sodium, saccharose, jaune orangé S (E110), arôme orange.
Excipients à effet notoire : saccharose, jaune orangé S (E110).



CLASSE THERAPEUTIQUE :

RYNZA® agit en exerçant 4 actions pharmacologiques :

- Paracétamol: analgésique et antipyrétique.
- Caféine: Stimulant central.
- Maléate de phéniramine: antihistaminique qui réduit les rhinorrhées et larmoiements.
- Phényléphrine hydrochloride: sympathomimétique, décongestionnant nasal par voie systémique.



INDICATIONS :

RYNZA® est utilisé dans le traitement symptomatique de la grippe : congestion et hypersécrétion nasales, éternuements, larmoiements, toux, courbatures, maux de tête, irritation de la gorge et fièvre.



POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans.



Posologie :

Un sachet toutes les 4 à 6 heures, sans dépasser 4 sachets par jour pendant une période de 5 jours. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.



Mode d'administration :

Voie orale.

Verser le contenu d'un sachet dans un verre, ajouter de l'eau chaude, mélanger jusqu'à dissolution de la poudre. peut être édulcoré avec le sucre ou le miel.

Prendre de préférence après les repas.



CONTRE-INDICATIONS :

Ce médicament est contre indiqué dans les cas suivants:

- Hypersensibilité à l'un des constituants du produit.
- Enfant de moins de 15 ans.
- insuffisance hépatocellulaire.

EN CAS DE DOUCE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pour éviter un risque de surdosage vérifier l'absence de Paracétamol dans la composition d'autres médicaments associés.

En cas de fièvre élevée ou persistante, de survenue des signes de surinfection ou de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

Eviter les boissons alcoolisées pendant le traitement, bien que rare, l'usage abusif du Paracétamol augmente le risque de toxicité hépatique chez les alcooliques.

Si vous êtes sportifs, faites attention ce médicament contient de la phényléphrine, il peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Ce médicament contient un agent colorant jaune orangé S (E110) et peut provoquer des réactions allergiques.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les

patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier lorsqu'il s'agit des anticoagulants oraux, certains antibiotiques de la famille des fluoroquinolones, l'alcool et les médicaments contenant de l'alcool, autres médicaments sédatifs, antidépresseurs, antihistaminique H1 atropiniques, antiparkinsoniens anticholinergiques, antispasmodiques atropiniques, neuroleptiques phénothiaziniques, autres sympathomimétiques indirects, et les autres médicaments contenant l'un des principes actifs du RYNZA®.



GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

la prise de ce médicament est déconseillé pendant la grossesse ou l'allaitement.

DE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.



CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES :

Ce produit peut entraîner un état de somnolence pouvant rendre dangereux la conduite et l'utilisation de machines.



EFFETS INDESIRABLES :

Les effets indésirables liés à la prise de RYNZA sont rares, les effets liés à chacun des principes actifs sont les suivants:

- Paracétamol : les effets sont généralement rares et modérés, des réactions allergiques telles qu'un rash cutané peuvent être observées.
- Phényléphrine hydrochloride : nausées, maux de têtes, augmentation de la pression artérielle, rarement palpitations.
- Maléate de phéniramine : sédation, maux de tête, constipation, sécheresse de la bouche.
- Caféine : nausées, vomissements et palpitations.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS CITE DANS CETTE NOTICE.



CONSERVATION :

Conserver à une température inférieure à 25°C dans un endroit sec.

NE PAS UTILISER APRES LA DATE DE PEREMPTION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT.

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Date de révision de la notice : Mars 2014.

Décision d'enregistrement n° : 14/08/22A 034/263



NT 060

Détenteur de la D.E. : BIOPHARM s.p.a
18, Rue de zone industrielle, route de la gare,
Haouche Mahieddine, Réghaia, Alger, Algérie
Fabricant et conditionneur : BIOPHARM s.p.a
Zone Industrielle Oued Smar, Alger, Algérie

٦١

شیوه: اینستاگرام

عليه تحوى على 5 أكياس.

يحتوى كل كيس نورى على:

ملالات الفيتناميين.....	20	مليون
فندل إيفرين هيدروليكروريد	10	مليون

السرعه: حمض الميتريل لا مائي، سكلرين صولينوم، سيريلات صولينوم 30 مصبع

لَا ينصح بتناول هذا **اللحم والمربيّة**:

بعضه عاملة، وبعدها يحصل على الماء. يحصل على الماء. يحصل على الماء.

يمكن أن يحدث هذا ال耀اء نعماً يعرض سلطني السيارات ومستعمل الآلات
السيارات في استعمال الآلات:

أشار خبر المشريخون فيها:

بيان الاستعمال
بيان الاستيفان أو بصمسي يبيان بغير مروجوب فيه أو مروجوب
في مکان جاف.

لا يستعمل بعد اقتضاء تاريخ المصادرية للنكر على التعينية.

رقم التسجيل في الجزاير : 034/263 14/08/22A

NT 060

صلب مفتر التسجيل: يتوافق مع المطلة، حيث محى الدليل رقم 18، المطالبة الصالحة، بالمطالبة الجازف، والبيان: المطالبة الصالحة، والمطالبة الجازف، والمطالبة الصالحة، والمطالبة الجازف، والمطالبة الصالحة، والمطالبة الجازف.