

Lire attentivement l'intégralité de la notice avant de prendre ce médicament.

- Conservez cette notice; vous pourrez avoir besoin de la consulter à nouveau.
- Pour d'autres questions demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
- Ce médicament vous est personnellement prescrit.
- Evitez de le conseiller à d'autres personnes, il peut affecter leur état de santé, même s'ils présentent les mêmes symptômes que vous.

Sur cette fiche signalétique

- 1- Qu'est ce que Rupafin 10 mg comprimés?
- 2- Avant d'utiliser Rupafin 10 mg comprimés.
- 3- Comment utiliser Rupafin 10 mg comprimés?
- 4- Effets indésirables potentiels.
- 5- Conservation de Rupafin 10 mg comprimés.

Rupafin® 10 mg Comprimés

Rupatadine

- Le principe actif de Rupafin 10 mg comprimés est la Rupatadine.
- Chaque comprimé contient 10 mg de Rupatadine sous forme fumarate.
- Les autres constituants sont prégalatinisés amidon de maïs, cellulose microcristalline, oxyde de fer (rouge) E172, oxyde de fer (jaune) E172, lactose monohydraté et stéarate de magnésium.

1 - Q'est ce que Rupafin 10 mg comprimés, et quand l'utiliser

La Rupatadine appartient à la classe des antihistaminiques non sédatifs. Rupafin 10 mg comprimés à 10 mg sont empaquetés dans les blisters, mis dans une boîte de 10 ou de 20 comprimés.

Rupafin 10 mg soulage les symptômes de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle tels que: éternuements, écoulement nasal, larmoiement, dermatoses prurigineuses au niveau des yeux du nez et du palais.

2 - Avant l'utilisation de Rupafin 10 mg comprimés

Evitez de prendre Rupafin 10 mg si vous êtes sujet à une hypersensibilité connue à la Rupafin 10 mg ou à l'un de ses constituants.

Ce médicament est contre indiqué chez les enfants de moins de 12 ans.

Mises en garde

Dans le cas d'insuffisance rénale ou hépatique, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Si l'âge est supérieur à 65 ans, demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien.

Grossesse et allaitement

Evitez de prendre Rupafin 10 mg pendant la grossesse et l'allaitement, sauf avis médical contraire.

Dans tous les cas, demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre simultanément d'autres médicaments.

Conduite et utilisation de machines

Aux doses habituelles recommandées, Rupafin 10 mg ne modifie pas votre vigilance ou habileté à conduire ou à utiliser des machines.

Prise d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien, si vous êtes mis sous un autre traitement ou avoir récemment pris un autre médicament (avec ou sans ordonnance), tel que:

Kétoconazole, érythromycine ou antidépresseurs cycliques SNC.

Information importante liée aux excipients de Rupafin 10 mg comprimé

Si vous présentez un syndrome d'intolérance connue à certains sucrels, prévenez votre médecin avant d'entamer le traitement.

3 - Comment utiliser Rupafin 10 mg comprimés

Prendre Rupafin 10 mg en ce conformant strictement à l'ordonnance de votre médecin.

En cas d'incertitude, vous devez vous assurer de la prescription auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.
Rupafin 10 mg est prescrit chez l'adolescent de plus que 12 ans et l'adulte.

Rupafin 10 mg comprimés est utilisé par voie orale.

Le comprimé est mélangé à une quantité de liquide (l'eau - titre indicatif). La posologie usuelle est de 10 mg de Rupatadine par jour en une seule prise; un comprimé/jour.

Votre médecin vous tient informés sur la durée de votre traitement.

Ne l'interrompez pas avant; les symptômes risquent de ne pas regresser.

Si vous prenez plus de comprimés de Rupafin 10 mg comprimés que prévu

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez accidentellement pris une dose supérieure à la dose prescrite.

Si vous avez oublié de prendre Rupafin 10 mg

Prenez votre dose aussi tôt que possible, et continuer avec le schéma habituel.

Ne prenez pas de double dose pour parer à l'oubli d'une dose unique.

4 - Effets indésirables

Comme les autres médicaments, Rupafin 10 mg comprimés peut entraîner des effets plus ou moins gênants, traduisant généralement: Une Somnolence, sensation de fatigue.

Plus rarement, on peut observer:

Un sécheresse buccale, inflammation de la muqueuse ou de la fosse nasale, sensation de pesanteur gastrique, appétit augmenté, CPK élevés et maux de tête.

Si vous remarquez un quelconque effet mentionné sur la notice, veuillez informez votre médecin.

5 - Conservation de Rupafin 10 mg comprimés

Tenir hors de la portée des enfants.

Garder les blisters dans leur emballage afin de les protéger de la lumière.

Tenir à une température ambiante (15 - 30 °C).

Ne pas utiliser Rupafin 10 mg comprimés au-delà de la date d'expiration, mentionnée clairement sur le blister et l'emballage extérieur.

Liste !!

Date de révision de la notice: 001/2009

Décision d'enregistrement numéro: 09/01A043/352

® est une marque déposée

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit qui utilisé en dehors de ses prescriptions peut nuire à votre santé.
- Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin et aux conseils du pharmacien.
- Le médecin et pharmacien connaissent les risques éventuels de ce médicament.
- Ne pas interrompre le traitement sans l'accord de votre médecin ou pharmacien.
- Ne pas reprendre le médicament sans une nouvelle ordonnance du médecin.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Conseil des Ministres Arabes de la Santé & Union des Pharmacien Arabes.

Grupa Uriach

EL KENDI

Fabriqué par et sous licence de: J.Uriach & Cia, S.A., Av. Camí Reial 51-5708184 Palau-solità i Megamans, Barcelona-Espagne.

Pour le compte: El Kendi Industrie du Médicament, Haouch Kaouche Lot. 02, N°: 14 Dely Brahim, Alger-Algérie.