

ROVAZINE® 500 mg

Mésalazine
Suppositoire

FORME ET PRÉSENTATION:

Suppositoire, boîte de 30.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:

Mésalazine : 500 mg.

Excipients : glycérides hémisynthétiques solides q.s.p.
un suppositoire.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

AGENT INTESTINAL ANTI-INFLAMMATOIRE (A :
Appareil digestif et métabolisme).

DANS QUEL (S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament est indiqué dans le traitement d'attaque des formes rectales de la rectocolite hémorragique (inflammation chronique de l'intestin).

ATTENTION !

DANS QUEL (S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance à l'aspirine ou à l'un des composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients présentant une maladie grave du foie ou du rein.

L'enveloppe contenant le suppositoire ne doit être ouverte qu'immédiatement avant son utilisation.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Si vous souhaitez allaiter votre enfant alors que vous êtes traitée par ce médicament, il convient de demander l'avis de votre médecin traitant.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT :

POSÉOLOGIE:

Réservez à l'adulte et au grand enfant (à partir de 15 ans).

Un suppositoire 2 à 3 fois par jour.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie rectale.

DURÉE DE TRAITEMENT :

La durée recommandée du traitement est de 4 semaines.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS:

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

- Quoi qu'exceptionnelles, des atteintes rénales (néphrites tubulo-interstitielles) ont été observées.
- Des atteintes pulmonaires (pneumopathies interstitielles), s'exprimant initialement par une toux avec fièvre, ont été observées.
- Augmentation de certains enzymes du foie (transaminases), hépatites.
- Des tableaux évoquant une allergie ont été observés. Ces tableaux présentent un ou plusieurs des symptômes suivants : fièvre, maux de tête, frissons, douleurs articulaires, douleurs musculaires, démangeaisons.
- Des pancréatites aiguës peuvent être observées.
- Atteintes des globules blancs, des globules rouges ou des plaquettes sanguines.
- Des atteintes du cœur (pericardites et plus rarement des myocardites) se manifestant par des douleurs au niveau du thorax et une difficulté à respirer, ont été décrites ; elles sont en règle générale rapidement réversibles à l'arrêt du traitement.
- Réaction d'intolérance locale : difficulté à garder le suppositoire, démangeaisons, sensation de spasme du canal anal.

Ces phénomènes peuvent survenir même quand l'effet du traitement est favorable.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

D.E. n° : 10/10 N 076/366

NE PAS LAISSER LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS

FABRIQUE PAR : 4 A SANTE INDUSTRIE

Zonne d'activité Oued Fodda - Chlef