

Rifamycine Chibret

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
 - Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique

- ***La substance active est : Rifamycine sodique..... 1 000 000 UI Pour 100 g de pommade ophtalmique.***
- ***Les autres composants sont : ascorbate de sodium, cholestérol, paraffine liquide légère, vaseline.***

TITULAIRE / EXPLOITANT : Laboratoires Théa - 12, rue Louis-Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

FABRICANT : FARMILA - THÉA FARMACEUTICI - Vie E.Fermi,50 - 20019 Settimo Milanese (MI) - ITALIE

1. QU'EST-CE QUE RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une pommade ophtalmique contenant un antibiotique : la rifamycine. Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections de l'œil dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique : conjonctivites, kératites (inflammation de la cornée d'origine bactérienne), ulcères de la cornée, blépharites (inflammation de l'œil et des paupières d'origine bactérienne) et orgelets (infection d'une glande de la paupière se présentant habituellement comme une pustule centrée sur un cil).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique ?

Ne pas utiliser RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique dans les cas suivants :

- en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants de la pommade, notamment à la rifamycine.

Prendre des précautions particulières avec RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique :

- Ne pas avaler.
- Informez votre médecin si vous avez une allergie connue. En cas d'allergie, arrêter le traitement.
- Ne pas utiliser de façon prolongée (plus de 7 jours) : en cas de persistance des symptômes au-delà de 7 jours ou d'aggravation des symptômes : consulter votre médecin.
- Cette pommade ne doit pas être utilisée lors du port de lentilles de contact souples, hydrophiles, qu'elle peut colorer de façon définitive. Par ailleurs, en cas d'infection de l'œil, le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement.
- **Cette pommade tache (vêtements, lunettes et autres...) ; elle doit être manipulée avec précaution.**

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas de gêne oculaire importante liée à l'infection bactérienne de l'œil, il est recommandé d'attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3 COMMENT UTILISER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g pommade

3. COMMENT UTILISER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique ?

1 à 2 applications par jour, dont une application le soir de préférence. Appliquer une quantité équivalente à un grain de blé de pommade dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil malade ou des yeux malades et éventuellement sur le bord de la paupière. Pour ce faire, tirer la paupière vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer la pommade entre la paupière et le globe oculaire.

Si vous avez l'impression que l'effet de RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie locale. En application oculaire.

Se laver soigneusement les mains.

Eviter de toucher l'œil ou la paupière avec l'embout du tube.

Reboucher le tube après utilisation.

La durée du traitement est habituellement de 7 jours, sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous avez utilisé plus de RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique que vous n'auriez dû : Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique est susceptible d'entraîner des effets indésirables :

- possibilité d'irritation passagère,
- risque de réaction allergique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI /100 g, pommade ophtalmique ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, sur le tube.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Avril 2006.

CONSEILS / ÉDUCATION SANITAIRE

Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique.

Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas : la dose à prendre, les moments de prise, et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2) Respectez strictement votre ordonnance.
- 3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.