

# Rifamycine Chibret 1 000 000 UI %

## Rifamycine sodique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

### RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution

- La substance active est : Rifamycine sodique ..... 1 000 000 UI pour 100 ml de collyre en solution.

- Les autres composants sont : acide ascorbique, disulfite de potassium (E224), povidone, méthylcellulose 4000 cps, édétate de sodium, thiomersal, eau purifiée.

**Liste des excipients à effet notoire** : Disulfite de potassium (E224), thiomersal.

**Titulaire/Exploitant/Détenteur de la DE** : Laboratoires Théa ?  
12, rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

**Fabricant** : LABORATOIRES TUBILUX PHARMA S.P.A  
Via Costarica - 20/22.00040 POMEZIA (RM) - ITALIE

### 1. QU'EST-CE QUE RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente en flacon (verre) de 10 ml avec compte-gouttes.

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antibiotique : la rifamycine.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections de l'oeil dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique : conjonctivites, kératites (inflammation de la cornée d'origine bactérienne) et ulcères de la cornée.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT D'UTILISER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution ?

**Ne pas utiliser RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution dans les cas suivants :**

- allergie à l'un des constituants du collyre, notamment à la rifamycine.

**Prendre des précautions particulières avec RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution :**

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- Informez votre médecin si vous avez une allergie connue. En cas d'allergie, arrêtez le traitement.
- Ne pas utiliser de façon prolongée (plus de 7 jours) : en cas de persistance des symptômes au delà de 7 jours ou d'aggravation des symptômes : consultez votre médecin.
- Ce collyre ne doit pas être utilisé lors du port de lentilles de contact souples, hydrophiles, qu'il peut colorer de façon définitive. Par ailleurs, en cas d'infection de l'oeil, le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement.

**Ce collyre tache (vêtements, lunettes et autres...) ; il doit être manipulé avec précaution.**

- En cas de traitement par un autre collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

### Allaitement

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

En cas de gêne oculaire liée à l'infection bactérienne de l'oeil, il est recommandé d'attendre la fin des symptômes pour conduire un véhicule ou utiliser une machine.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre.

*Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.*

## collyre en solution ?

1 à 2 gouttes de collyre, 4 à 6 fois par jour, selon la gravité, pendant 7 jours en moyenne. Instiller les gouttes de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'oeil (paupière inférieure) ou des yeux malade(s) en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.

*Si vous avez l'impression que l'effet de RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.*

## Voie locale - EN INSTILLATION OCULAIRE.

Lavez-vous soigneusement les mains. Préparez le flacon compte-gouttes : Déchirez la capsule d'aluminium du flacon en tirant sur la languette dans le sens des empreintes, puis retirez le bouchon en caoutchouc du flacon. Sortez l'embout compte-gouttes de l'emballage stérile. Placez l'embout compte-gouttes sur le flacon et poussez-le bien à fond. Retirez le capuchon de protection. Evitez de toucher l'oeil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes. Remettez soigneusement le capuchon de protection en place après utilisation.

La durée du traitement est habituellement de 7 jours, sauf avis contraire de votre médecin.

**Si vous avez utilisé plus de RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution que vous n'auriez dû :**

*Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.*

**Si vous oubliez de prendre RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution :**

*Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.*

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution est susceptible d'entraîner des effets indésirables : possibilité d'irritation passagère, risque de réactions allergiques.

- En raison de la présence de disulfite de potassium, risque de réactions allergiques, y compris réactions allergiques généralisées avec gêne respiratoire.
- Ce médicament contient un conservateur, le thiomersal ; par conséquent, il existe un risque de réactions allergiques.

*Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.*

## 5. COMMENT CONSERVER RIFAMYCINE CHIBRET 1 000 000 UI POUR CENT, collyre en solution ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C et à l'abri de la lumière. La durée de conservation après ouverture est de 15 jours. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, sur le flacon.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est AVRIL 2006.

*Date Approbation Algérie : Juin 2013*

Liste 1

DE Algérie N° : 15/99/ 17 D 033/022

Enreg. TN: n° 8443051

## CONSEILS / EDUCATION SANITAIRE

### Que savoir sur les antibiotiques ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs. La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques. Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas : la dose à prendre, les moments de prise, et la durée du traitement.

### En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- 1) N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.
- 2) Respectez strictement votre ordonnance.
- 3) Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.
- 4) Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.
- 5) Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

