

Respinhal

Oxymétaزoline

0,05 %

SOLUTION
POUR PULVÉRISATION
NASALE

Composition

Oxymétaزoline 0,05 mg

Excipients : Chlorure de benzalkonium, sorbitol, glycine, hydroxyde de sodium, eau purifiée. Q.s.p1ml.

Indications thérapeutiques:

Traitemennt symptomatique des états congestifs au cours des rhinites, sinusites, rhino-pharyngites, laryngites, coryza et de toutes les affections au cours desquelles on préconise une action décongestive de la muqueuse du rhino-pharynx.

Posologie

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 2 ou 3 nébulisations dans chaque narine, 1 ou 3 fois par jour (matin et soir).

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des constituants.

Association déconseillée au IMAO.

Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Mise en garde et précautions d'emploi

Du fait de la présence d'un vasoconstricteur la prudence s'impose en cas d'hypertension, d'hyperthyroïdie, de diabète ou d'affections cardiaques.

Ne pas utiliser de façon prolongée (pas plus de 5 jours), en raison d'un risque de rebond ou de rhinite iatrogène.

Grossesse et allaitement:

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Pendant l'allaitement, ce médicament est déconseillé, en raison de possibles effets cardiovasculaires chez le nourrisson.

Intéractions médicamenteuses

Ne pas associer aux IMAO.

Effets indésirables

L'emploi de doses thérapeutiques ne produit aucun effet indésirable.

Lors de l'emploi de doses élevées, des céphalées, des nervosités, des sécheresses buccales peuvent survenir, mais elles disparaissent lors du réajustement de la dose.

Surdosage

L'oxymétaزoline peut provoquer à doses élevées et notamment chez l'enfant hypothermie, sédation, perte de la connaissance, coma ou dépression respiratoire.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

BIOGALENIC

ZI Zighoud Youcef

25200 Constantine - Algérie