

Rennie**Déflatine®****comprimé à croquer**

Carbonate de calcium, carbonate de magnésium, diméticone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

1 - QU'EST-CE QUE RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIAÏDE (A : Appareil digestif et métabolisme). Ce médicament est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 15 ans en cas de brûlures d'estomac (excès d'acidité gastrique) associées à des ballonnements.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans Rennie® Déflatine®,
- En cas de maladie rénale (défaillance des fonctions du rein) du fait de la présence de carbonates de calcium et de magnésium,
- En cas d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer :**Mises en garde spéciales**

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :

- Si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- Si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- Si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- Si vous souffrez d'une maladie des reins.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).

Précautions d'emploi

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Ce médicament ne doit pas être pris avec de grandes quantités de lait ou de produits laitiers. L'association avec les diurétiques thiazidiques doit être évitée en raison du risque d'hypercalcémie.

EN CAS DE DOUCE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Ce médicament contient des antiacides (carbonate de calcium et carbonate de magnésium). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Ce médicament peut diminuer l'effet de nombreux autres médicaments. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Par précaution, il convient de ne pas prendre au même moment ce médicament et un autre médicament. Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Associations à prendre en compte

Diurétiques thiazidiques et apparentés : risque d'hypercalcémie par diminution de l'élimination urinaire du calcium.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Sans objet.

Informations importantes concernant certains composants de RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer : Excipient à effet notoire : sorbitol.

3 - COMMENT PRENDRE RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer ?**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

En cas de douce, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La posologie habituelle par 24 heures est de 1 à 2 comprimés à sucer ou à croquer, 2 à 3 fois par jour au moment des douleurs. Ne pas dépasser 7 comprimés par jour. Si vous avez l'impression que l'effet de RENNIE® DEFLATINE® est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie orale. Sucrez ou croquez les comprimés.

Fréquence d'administration

Prenez 1 à 2 comprimés au moment des douleurs. Respectez la posologie maximale.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours. En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

Si vous avez pris plus de RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage des troubles du transit peuvent apparaître (diarrhée), dans ce cas, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

Si vous oubliez de prendre RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4 - QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Possibilité de troubles digestifs (diarrhées),
- A doses fortes et prolongées, survenue possible d'hypercalcémie (taux anormalement élevé de calcium dans le sang), de calculs et troubles rénaux graves.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 - COMMENT CONSERVER RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6 - INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**Que contient RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer ?****Les substances actives sont :**

Carbonate de calcium	680 mg
Carbonate de magnésium lourd	80 mg
Diméticone activé (Silbione Antimousse) (1)	25 mg

Pour un comprimé à croquer.

Les autres composants sont :

Sorbitol, talc, amidon de maïs prégélatinisé, amidon de pomme de terre, stéarate de magnésium, arôme menthe⁽¹⁾, arôme citron⁽²⁾.

⁽¹⁾ Diméticone activé (Silbione Antimousse) : polydiméthyl-siloxane activé par la silice.

⁽²⁾ Composition de l'arôme menthe : mélange d'huiles essentielles de Mentha piperita-dextrine.

⁽³⁾ Composition de l'arôme citron : huiles essentielles partiellement déterpénnées-dextrine.

Qu'est ce que RENNIE® DEFLATINE®, comprimé à croquer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimés à croquer. Boîte de 18.

Détenteur de DE / Exploitant

BAYER SANTE FAMILIALE, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard – France

Fabricant

DELPHARM GAILLARD, 33, rue de l'industrie, 74240 Gaillard – France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 3 janvier 2011.

DE Algérie N° : 09/10 B 182/395. Date de mise à jour de la notice en Algérie : mars 2013