

# Regulax®

DOCUSATE DE SODIUM 0,12g

VEUILLEZ lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques; cela pourrait lui être nocif.

## FORME ET PRÉSENTATION

gel par voie rectale.

Boîte de 6 unidoses de 10 g sous forme de tube-canule.

## COMPOSITION

Chaque unidose contient :

Docusate sodique (DCI)..... 0,12 g

Excipients : carboxy méthyl cellulose, glycérol, eau purifiée.

## CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Laxatif lubrifiant. (A : appareil digestif et métabolisme)

## DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### (Indications thérapeutiques)

Ce médicament est un laxatif qui doit être administré par voie rectale. Il ramollit les selles et déclenche une contraction qui permet leur évacuation.

Il est indiqué dans le traitement symptomatique des constipations occasionnelles et pour la préparation du cиlon et du rectum aux examens endoscopiques.

## COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### (Posologie et mode d'administration)

Adulte et enfant à partir de 12 ans.

Utiliser un seul tube-canule et si l'action est

insuffisante, un deuxième tube peut être administré le jour même ou le lendemain.

Enlever le capuchon de la canule, introduire complètement la partie effilée du tube dans le rectum et vider par pression tout le contenu du tube. Retirer la canule sans relâcher la pression sur le tube. Laisser agir 5 à 20 minutes.

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

### (Contre-indications)

-Enfant et adolescent de moins de moins de 12 ans.

-Hypersensibilité au produit ou à l'un de ses constituants.

-Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'hémorroïdes fortement développées, de fissure anale, de rectocolite ulcéro-hémorragique, d'obstruction intestinale et de douleurs abdominales sans cause précise.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**ATTENTION :** comme tous les laxatifs, ce médicament ne doit pas être utilisé de façon prolongée sans avis médical.

Des précautions sont nécessaires chez les personnes atteintes d'hémorroïdes, de fissures anales, de rectocolite hémorragique ou d'occlusion intestinale.

Chez l'enfant, l'usage des laxatifs par voie rectale doit rester exceptionnel.

La prudence est recommandée chez les personnes âgées.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement sur avis de votre médecin.

## EFFETS INDESIRABLES

L'usage prolongé de ce médicament peut occasionner des sensations de brûlures anales et exceptionnellement une inflammation du rectum.

## INTERACTIONS MÉDICATIONEUSES

Le Docusate de sodium peut renforcer la résorption de certains médicaments et ne peut être utilisé en

association avec d'autres médicaments potentiellement hépatotoxiques.

En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## SURDOSSAGE

Aucun cas de surdosage n'a été signalé à ce jour.

## CONSERVATION

Maintenir à une température inférieure à 25°C.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

**DERNIÈRE DATE A LAQUELLE CETTE NOTICE A ÉTÉ APPROUVEE :** Avril 2013

**DÉCISION D'ENREGISTREMENT N° :** 13/10 M 063/311

## FABRICANT ET DÉTENTEUR DE LA D.E

Sarl. LGPA . Z.I. de réghaia. Route de la gare.  
Alger. Algérie.

