

Pulsagen[®]

Nicardipine

L.P 50mg



1- Forme et présentation :

Gélules à libération prolongée, Boite de 60 gélules

Composition pour une gélule :

Nicardipine chlorhydrate.....50 mg

Excipients : Sphères de sucre, hypromellose, polysorbate 80, isopropanol, acetone, acide methacrylic, talc purifié.

Excipient à effet notoire : sphères de sucre.

Classe pharmaco thérapeutique :

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire.

2- Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle.

3- Contre-indications :

Hypersensibilité connue à la nicardipine.

4- Interactions médicamenteuses :

Déconseillée par prudence : le dantrolène(en perfusion).

Nécessitant des précautions d'emploi :

antiépileptiques, inducteurs enzymatiques (carbamazepine, phénobarbital, phénytoïne, primidone), baclofène, ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, itraconazole, rifampicine.

A prendre en compte : α bloquants à visée urologique, amifostine, anti dépresseurs imipraminiques, neuroleptiques, β bloquants, corticoïdes, tetracosactide (voie générale).

5- Précautions et Mises en garde spéciales :

Tenir compte de la présence de saccharose en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-iso maltase.

6- Posologie et mode d'administration :

Voie orale.

La posologie usuelle est d'une gélule matin et soir avant les repas.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin

7- Grossesse et allaitement :

Grossesse : par précaution il est préférable de ne pas utiliser la nicardipine pendant la grossesse.

Allaitement : éviter l'administration de pulsagen chez la femme qui allaite (passage dans le lait maternel).

8- Effets indésirables :

Comme tout médicament, pulsagen peut provoquer chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants :

- le plus souvent : sensations vertigineuses, œdèmes des membres inférieurs, céphalées, bouffées vasomotrices, palpitations.
- Ces effets apparaissent généralement en début du traitement, et disparaissent dès l'arrêt du traitement
- plus rarement : tachycardie, hypotension pouvant être symptomatique, syncope, troubles digestifs (nausées et vomissements), thrombopénies, gonflement léger des gencives,
- très rarement modification des fonctions hépatiques (élévation des enzymes hépatiques), cas isolés d'hépatites.

9- Surdosage :

En cas de prise excessive, ce médicament peut provoquer une accélération du rythme cardiaque.

La nicardipine n'est pas dialysable. Il convient de veiller au maintien du rythme et du débit cardiaque. Une hypotension importante peut être combattue par perfusion IV de tout moyen d'expansion volémique.

10- Conservation :

Dans son emballage à l'abri de l'humidité

Conditions de prescription : Liste I

Date de révision de la notice : Mai 2009

DE N° : 065/06B 015/12

Fabricant et détenteur de la D.E. :

**Genericlab, B.P. 73 Voie C, Zone industrielle
Rouiba - Alger - Algérie.**