



# Proviron®

Mestérolone



Pour l'androgénothérapie orale chez l'homme

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations au médecin ou au pharmacien.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

## Dans cette notice

1. Qu'est-ce que Proviron® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron® ?
3. Comment utiliser Proviron® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Proviron® ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. Qu'est-ce que Proviron® et dans quel cas est-il utilisé ?

### Qu'est-ce que Proviron® ?

Proviron® est un médicament qui contient de la Mestérolone. C'est une forme d'androgénothérapie chez l'homme.

### Dans quel cas Proviron® est-il utilisé ?

- Proviron® est indiqué chez l'homme en cas de déficit androgénique (production insuffisante d'androgènes (hormones mâle)).
- Proviron® est indiqué chez l'homme également en cas de stérilité qui est due à des niveaux faibles des hormones mâles (engendrés par un Hypogonadisme, mauvais fonctionnement des testicules).

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Proviron® ?

### Contre-indications :

Hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des excipients.

Proviron® est contre-indiqué en présence de cancer de la prostate.

Antécédents ou présence d'une tumeur hépatique.

### Mise en garde spécial et précautions d'emploi :

Par prudence des examens réguliers de la prostate au cours du traitement sont conseillés, afin d'exclure le cancer de la prostate.

Dans de rares cas il a été observé, à la suite de l'utilisation des principes actifs hormonaux tels que celui contenu dans Proviron, des altérations hépatiques bénignes et, plus rarement encore, de nature maligne, qui ont entraîné, dans des cas d'espèce, des hémorragies intra abdominales constituant une menace vitale. Veuillez informez votre médecin en cas de troubles ou des douleurs épigastriques ne cédant pas rapidement d'eux-mêmes.

Les androgènes ne sont pas appropriés pour stimuler le développement musculaire chez les sujets sains ni pour augmenter l'efficience physique.

Des érections fréquentes ou persistantes du pénis peuvent se produire.

Proviron® est indiqué uniquement pour les hommes.

### Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Veuillez informez votre médecin si vous prenez ou vous avez récemment un médicament même ceux obtenus sans ordonnance.

## Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

La prise de Proviron n'a montré aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

### Excipients à effet notable :

#### Lactose :

Si vous savez que vous ne pouvez pas tolérer ou digérer certains sucre, parlez-en à votre médecin avant de prendre Proviron.

#### Méthyle et Propyl parahydroxybenzoate :

Ils peuvent causer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

## 3. Comment utiliser Proviron® ?

Avalez les comprimés sans croquer avec un verre d'eau.

Toujours respectez les doses prescrites par votre médecin

### Adultes :

Début de prise : 3 ou 4 comprimés par jour pendant plusieurs mois, suivis d'un

Traitement d'entretien de 2 à 3 comprimés (50-75mg) par jour.

### Enfant :

Non recommandé chez les enfants.

### Que faire en cas d'oubli d'une dose de Proviron ?

Ne pas doubler la dose pour compenser la dose oubliée. Quand vous vous rappelez prenez la dose suivante et continuez votre traitement normalement.

## 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

- Des érections fréquentes peuvent se produire dans certains cas. Il faudrait réduire la dose ou suspendre le traitement afin d'éviter des blessures au pénis.
- Si vous présentez des douleurs abdominales qui ne disparaissent pas rapidement d'eux même, il faut avertir votre médecin.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

## 5. Comment conserver Proviron® ?

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne pas utiliser Proviron après la date d'expiration mentionnée sur la boîte.

Gardez les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.

## 6. Informations supplémentaires :

### Que contient Proviron ?

Substance active : Mestérolone.

### Dosage :

Chaque comprimé contient 25mg de Mestérolone.

### Forme pharmaceutique :

Comprimé sécable.

### Excipients :

Lactose, Amidon de maïs, Povidone 25000

Stéarate de magnésium.

Méthyle parahydroxybenzoate.

Propyl parahydroxybenzoate.

### Présentation :

Boîte de 20 comprimés sécables blancs.

### Détenteur de la Décision d'Enregistrement (D.E.) :

Bayer PLC

### Adresse :

BAYER HOUSE, STRAWBERRY HILL, NEWBURY, BERKSHIRE, RG14 1JA, UNITED KINGDOM

### Fabricant :

Bayer Weimar GmbH und Co.KG

### Adresse :

DÖBEREINERSTRASSE 20,  
D-99427, Weimar, Allemagne

### N° de la Décision d'enregistrement (D.E.) :

97/25H 021/070

Liste I: Uniquement sur prescription médicale.

Mise à jour du texte;

Mai 2008