

progestogel[®] 1%

Progesterone

Veuillez lire attentivement cette notice car elle contient des informations importantes pour vous.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser PROGESTOGEL avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez besoin, de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes, s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

PROGESTOGEL 1 % gel, progesterone.

La substance active est la progesterone 1g.

Les autres composants sont : octylododécanol, carbomère 980, hydroxystéarate de macrogolglycérol, trolamine, éthanol 96%, eau purifiée q.s.p 100 g de gel.

-Contient de l'huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée un excipient à effet notoire et peut provoquer des réactions cutanées (par exemple eczéma)

1. QU'EST-CE QUE PROGESTOGEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Gel pour application locale en tube de 80 g.
PROGESTATIF (G : Système génito-urinaire et hormones sexuelles).

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs et de maladies bénignes des seins.

2. INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER PROGESTOGEL

- Contre-indications:

hypersensibilité à la substance active ou l'un des excipients.

- Grossesse:

ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse.

- Allaitement:

l'utilisation de la progesterone est possible au cours de l'allaitement; en cas d'application sur les seins, bien les nettoyer avant chaque tétée.

Demander l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

- Prise d'autres médicaments :

+inducteurs enzymatiques
diminution de l'effet du progestatif, surveillance clinique et adaptation du traitement hormonal

pendant l'administration de l'anticonvulsivant inducteur et après son arrêt.

3. COMMENT UTILISER PROGESTOGEL ?

Si vous avez l'impression que l'effet de PROGESTOGEL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie est de une mesure de l'applicateur, sur chaque sein.

Le traitement sera de préférence continu, tous les jours du mois, y compris pendant les règles.

Etaler après la toilette, sur chaque sein, jusqu'à pénétration du produit.

Se laver les mains après application.

Si vous oubliez de prendre PROGESTOGEL

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant.

5. COMMENT CONSERVER PROGESTOGEL ?

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte et le tube.

Détenteur de la DE : Laboratoire Besins International 03, Rue du Bourg l'Abbé, 75003, PARIS, FRANCE

Fabricant et Conditionneur:

Besins Manufacturing Belgium : Groot-Bijgaardenstraat 128, 1620, DROGENBOS, BELGIQUE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mars 2014

Médicament autorisé n° 313 141. 2.

DE Algérie N° 99/09N067/169.

Autres informations

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament veuillez contacter :



LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
03, Rue du Bourg l'Abbé, 75003 PARIS