

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**1. QU'EST-CE QUE PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmacothérapeutique :ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTRHUMATISMAUX, NON STÉROIDIENS. (M: Muscle et Squelette).**

**Indications thérapeutiques:**Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïden: le ketoprofène. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) en traitement de longue durée de:

- certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
- certaines arthroses sévères.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONTRAIRE AVANT D'UTILISER PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée?****Contre-indications**

N'utilisez jamais PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée dans les cas suivants:

- au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédent d'allergie au ketoprofène ou à l'un des constituants du produit,
- antécédents de réactions d'hypersensibilité telles que bronchospasmes, asthme, rhinite, urticaire ou autres réactions allergiques au ketoprofène ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine. Des réactions anaphylactiques sévères, rarement fatales, ont été rapportées chez des patients ayant de tels antécédents,
- antécédents de saignements gastro-intestinaux ou de perforation digestive liés à des traitements antérieurs par AINS,
- ulcère ou saignement de l'estomac ou de l'intestin en évolution ou récidivant,
- hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du rein,
- maladie grave du cœur,

**Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

Faites attention avec PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée:

**Mises en garde:** CE MÉDICAMENT NE DOIT ÊTRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE.

Les médicaments tels que PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risques pour ce type de pathologie (par exemple en cas de pression artérielle élevée, de diabète, de taux de cholestérol élevé ou si vous fumez), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne pas dépasser les doses prescrites ni la durée de traitement.

**Précautions d'emploi:** Comme il pourrait être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important d'informer votre médecin avant de prendre PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée dans les cas suivants:

- antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une gêne respiratoire ou une crise d'asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïden (voir rubrique «N'utilisez jamais PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée»),
- maladie du cœur (hypertension et/ou insuffisance cardiaque), du foie ou du rein, ainsi qu'en cas de rétention d'eau,
- troubles de la coagulation,
- maladie inflammatoire chronique de l'intestin (elle qui maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique),
- antécédents digestifs (ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien),
- traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodenal ou d'hémorragie, par exemple des glucocorticoïdes, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que l'aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée (voir rubrique «Prise ou utilisation d'autres médicaments»),
- antécédents de réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage).

**AU COURS DU TRAITEMENT, en cas:**

- de signes d'infection ou d'aggravation des symptômes, PREVENIR VOTRE MEDECIN. Comme tout anti-inflammatoire non stéroïden, le ketoprofène peut masquer les symptômes d'une infection sous-jacente (comme la fièvre),
- de signes évocateurs d'allergie à ce médicament, notamment crise d'asthme, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

• d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir) ou d'ulcération gastro-intestinale. ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE.

• de trouble de la vision (vision floue), arrêtez le traitement et PREVENIR VOTRE MEDECIN.

Si vous êtes une femme, PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée peut altérer votre fertilité. Vous ne devez donc pas prendre ce médicament si vous souhaitez concevoir un enfant, si vous présentez des difficultés pour procréer ou si des examens sur votre fonction de reproduction sont en cours.

Les sujets âgés et les sujets de faible poids corporel présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être réduite.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïden: le ketoprofène.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

**Interactions avec d'autres médicaments****Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance, car il y a certains médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d'autres qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu'ils sont pris ensemble.

Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez ou recevez l'un des médicaments suivants avant de prendre PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée:

- acide acétylsalicylique (aspirine) ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens,
- corticostéroïdes,
- anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme la ticlopidine,
- lithium,
- méthotrexate,
- inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l'angiotensine II,
- certains antidiépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- deferasirox,
- ciclosporine, tacrolimus,
- pemtrexed.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

apres le 1er jour de vos dernières règles, votre médecin peut être averti, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

De 2,5 à 5 mois de grossesse révolus (12 à 24 semaines d'aménorrhée), ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et en prise brève. L'utilisation prolongée de ce médicament est fortement déconseillée.

Après de 5 mois de grossesse révolus (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte de plus de cinq mois révolus, parlez-en à votre gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.

**Allaitement:** Ce médicament passe dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines****Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges, une somnolence, des convulsions ou des troubles visuels. Il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines si l'un de ces symptômes apparaît.

**3. COMMENT UTILISER PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée?**

**Durée de traitement et Posologie:** 1 comprimé à 200 mg par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Mode d'administration:** Voie orale. Le comprimé est à avaler tel quel, avec un grand verre d'eau.

**Fréquence d'administration:** le comprimé est à prendre au cours d'un repas et en 1 prise par jour.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Durée de traitement:** DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

**Symptômes et instructions en cas de surdosage**

Si vous avez pris plus de PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée que vous n'auriez dû: En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

**Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses:** Si vous oubliez de prendre PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée: Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

**Description des effets indésirables:**Comme tous les médicaments, PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée est susceptible d'entrainer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les médicaments tels que PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral. En général, la fréquence des effets indésirables est classée comme suit:

• Très fréquent (plus de 1 personne sur 10); fréquent (plus de 1 personne sur 100 et moins de 1 personne sur 10);

• Peu fréquent (plus de 1 personne sur 1000 et moins de 1 personne sur 100);

• Rare (plus de 1 personne sur 10000 et moins de 1 personne sur 1000);

• Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Peuvent survenir des réactions allergiques:

• cutanées:

- peu fréquent: éruption sur la peau, démangeaisons,

- fréquence indéterminée: urticaire, aggravation d'urticaire chronique.

• respiratoires:

- rare: crise d'asthme,

- fréquence indéterminée: rhinite, gêne respiratoire notamment chez les sujets allergiques à l'aspirine ou à des anti-inflammatoires non stéroïdiens.

• générales:

- fréquence indéterminée, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), choc allergique.

Peuvent également survenir:

• Des troubles digestifs:

- Fréquence indéterminée: une hémorragie digestive, une perforation digestive (voir rubrique «Précautions d'emploi»). Celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée et la durée de traitement prolongée.

• Des troubles cutanés:

- fréquence indéterminée: une réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV (cabine de bronzage), un décolorlement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps (syndrome de Stevens Johnson et syndrome de Lyell).

Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

À cours du traitement, il est possible que surviennent également:

• des troubles digestifs:

- fréquent: nausées, vomissements, difficulté pour digérer, douleurs abdominales, maux d'estomac,

- peu fréquent: diarrhée, constipation, flatulence, gastrite,

- rare: stomatite, ulcère gastro-intestinal, colite,

- fréquence indéterminée: aggravation d'une inflammation de l'intestin, d'une maladie de Crohn.

• des troubles neurologiques

- peu fréquent: maux de tête, vertiges, somnolence,

- rare: sensation de fourmillements et de picotements

- fréquence indéterminée: convulsions, troubles de l'humeur, troubles du goût.

• des troubles auditifs

- rare: bordourments d'oreille,

• des troubles oculaires

- rare: troubles de la vue (vision floue).

• des troubles cardiaques

- peu fréquent: œdème,

- fréquence indéterminée: hypertension, insuffisance cardiaque, vasodilatation.

• des troubles cutanés

- fréquence indéterminée: chute des cheveux ou des poils.

• des troubles généraux

- peu fréquent: fatigue

- rare: prise de poids

• Des modifications biologiques:

- rare: anémie due à un saignement, diminution des globules blancs,

- fréquence indéterminée: diminution importante de certains globules blancs pouvant provoquer des infections graves (granulocytose), diminution des plaquettes, insuffisance de la moelle osseuse.

• Hépatiques:

- rare: augmentation des enzymes hépatiques, hépatite, augmentation de la bilirubine,

- rares: névralgies

- fréquence indéterminée: hyperkaliémie, maladie rénale, défaillance du fonctionnement rénal.

DANS TOUS CES CAS, IL FAUT EN AVERTIR VOTRE MEDECIN.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée?**

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.**

**Date de péremption:** Ne pas utiliser PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

**Conditions de conservation:** A conserver à une température ne dépassant pas 25°C à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES: Liste complète des substances actives et des excipients**

Que contient PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée?

La substance active est: Kétoprofène ..... 200 mg Pour un comprimé enrobé.

Les autres composants sont: Hydrogénophosphate de calcium ,hydroxyéthylcellulose,stéarate de magnésium,acetylpylate de cellulose,phthalate de diéthyle.

Forme pharmaceutique et contenu: Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé à libération prolongée ; Boîte de 14.

Titulaire: Sanofi afonov Algérie spa [Micro zone d'activité Bt B Lot 29,30, 31 Hydra Alger]

Fabricant: PRODIPHAR production [Zone industrielle de Rouiba Alger –Algérie]

Date d'approbation de la notice : Mis à jour : 10/11/2011