

PROCTOLON®

Trimébutine - Ruscogénines 120/10mg



FORME ET PRÉSENTATION

Suppositoires. Boîte de 10 suppositoires

COMPOSITION

Trimébutine 120mg
Ruscogénines 10 mg
Excipients Glycérides hémisynthétiques solides qsp 1 suppositoire

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est un antihémorroïdaire local associé à une action spasmolytique musculotrope. Il est utilisé dans le traitement symptomatique des manifestations douloureuses et prurigineuses anales, des syndromes fissuraires, en particulier dans la crise hémorroïdaire.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

PROCTOLON est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales.
- Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, un examen proctologique doit être pratiqué et le traitement doit être revu.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il convient de signaler tout autre traitement en cours à votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Réservé à l'adulte.

La posologie habituelle est de 1 à 2 suppositoires par jour.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie rectale.

DUREE DE TRAITEMENT

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES

Rares réactions cutanées (suppositoires).

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

PRÉCAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

Conserver à une température inférieure à 25°C.

CONDITION DE DELIVRANCE

LISTE II

Ne jamais laisser ce médicament à la portée des enfants.

N° DE : 01/10P 084/231

Date de mise à jour de la notice : Septembre 2015





بروكتولون®

تريميبوتين روسيوجينين 120/10 مغ

شكل و تقديم

تحميلات تحوي 120 / 10 مغ. علبة ذات 10 تحميلات

التركيب

تريميبوتين 120 مغ

روسيوجينين 10 مغ

ساغ: غليسيريد نصف تركيبي جامد. ك.ك. ل.تحميلة واحدة

كيف يستعمل هذا الدواء

المقادير

مخصص للكبار المقدار العادي هو تحميلة إلى تحميلتان في 24 ساعة، في كل الحالات يجب التقيد بتوجيهات الطبيب.

طريقة الإستعمال

عن طريق الشرج

مدة العلاج

يجب التقيد بتوجيهات الطبيب.

التأثيرات الغير مرغوب فيها

نادراً تأثيرات موضعية يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي تأثير غير وارد في هذا المنشور

الحمل والرضاع

بصفة عامة يجب أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي في حالة الحمل أو الرضاع قبل تناول هذا الدواء.

شروط الحفظ

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة دون 25°

شروط الاستطباب

قائمة II

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

مقرر التسجيل رقم : 101/10P 084/231

تاريخ تحديث النشرة : سبتمبر 2015

متى يستعمل هذا الدواء

إن هذا الدواء مضاد لل بواسير.

الريميبوتين له فعالية ضد التشنجات العضلية الملساء

و يعتبر كمخدر موضعي. روسيوجينين له فعالية ضد الالتهاب الموضعي وواق للشرابين.

- التهاب شرجي ناتج عن ال بواسير

- شقوق شرجية

- حالات النزيف ال بواسيرية و الشقيقة للمستقيم

متى لا يستعمل هذا الدواء

إن هذا الدواء لا يستعمل في حالة حساسية مفرطة لإحدى

مكونات هذا الدواء.

الإجراءات الواجب أخذها أثناء الاستعمال

- إن استعمال هذا الدواء لا يعني عن استعمال أدوية

أخرى مضادة للأمراض الشرجية

- استعمال بروكتولون يجب أن يكون لمدة قصيرة

و إذا لم يتم الشفاء يجب القيام بفحص بروكتولوجي و

إعادة النظر في الدواء

التفاعلات دوائية

لتتجنب تفاعلات مع أدوية أخرى، يجب إبلاغ طبيبكم أو الصيدلي بأي علاج تتناولوه.



حامل مقرر التسجيل، مصنع، معين :
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلامة - الجزائر
www.labosalem.com

مخابر سالم

زنـ زـ زـ زـ زـ

01/10P 084/231

