

NITRATE D'ÉCONAZOLE® Pevaryl 1% SOLUTION pour application locale



Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

COMPOSITION

Formule pour 100 g :

nitrate d'éconazole 1 g

Excipients : éthanol, propylèneglycol, trométamol, parfum.

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour application locale en flacon pulvérisateur de 30 g avec pompe doseuse.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFONGIQUE LOCAL

(D : Dermatologie)

TITULAIRE

McNeil S.A.S.

1 rue Camille Desmoulins TSA 20005

92787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9

FRANCE

EXPLOITANT

JANSSEN-CILAG

1 rue Camille Desmoulins TSA 91003

92787 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9

FRANCE

FABRICANT

LUSOMEDICAMENTA S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B

Queluz de Baixo

2730-055 BARCARENA

PORTUGAL

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est une solution pour application locale contenant un antifongique de la famille des imidazolés. Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Évitez l'application près des yeux et sur les muqueuses génitales.
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface ou sur une peau lésée, respectez impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Ethanol, propylèneglycol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

Appliquer 2 fois par jour sur toutes les zones atteintes après toilette et séchage de la peau.

Faire suivre l'application d'un massage doux et régulier jusqu'à pénétration complète.

MODE D'ADMINISTRATION

VOIE CUTANÉE

DURÉE DU TRAITEMENT

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations (ongles). L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MÉDECIN.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs et dans de très rares cas, des réactions allergiques à type d'eczéma ont été observées : IL FAUT EN AVERTIR VOTRE MÉDECIN.

SIGNELEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

A conserver de préférence à une température inférieure à 25°C.



JANSSEN-CILAG

Date de révision de la notice : Avril 2006

© J-C 2006

DZ - P1604093C - R