

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose et dans quel cas est-il utilisé ?

ANTI-FLATULENT – ANTI-ACIDE.

(A : Appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est indiqué dans le traitement des maux d'estomac.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose : Si vous êtes allergiques (hypersensible) à l'un des constituants.

Faites attention avec PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose : Mise en garde

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament est contre-indiqué chez les patients présentant une intolérance au fructose.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament peut, dans les conditions normales d'utilisation, être pris au cours de la grossesse et de l'allaitement.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines :

Sans objet.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), sorbitol.

3. COMMENT PRENDRE PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose?

Posologie :

Voie orale.

Absorbez directement le contenu d'1 ou 2 sachets-dose, 2 à 3 fois par jour avant le repas ou au moment des douleurs.

Si vous avez pris plus de PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose que vous n'auriez du, consulter votre médecin ou pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des réactions d'hypersensibilité telles qu'éruption cutanée ou prurit ont été exceptionnellement rapportées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose après la date de péremption sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose ?

Les substances actives sont :

Diméticone : 3,000 g

Gaïazulène : 0,004 g

Pour un sachet-dose de 10 g.

Les autres composants sont :

Sorbitol à 70% (cristallisables), carraghénates, cyclamate de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), huile essentielle de menthe poivrée, eau purifiée.

Qu'est-ce que PEPSANE®, gel buvable en sachet-dose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel buvable. Boîte de 30 sachets-dose (Papier Kraft – PEBD-Aluminium)

Détenteur de la décision d'enregistrement / Libérateur de lot / Fabricant :

LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA
2, Avenue du Traité de Rome – B.P. 51

78401 Chatou Cedex – France

Siège social : 68, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris - France

Site de fabrication :

Laboratoires PHARMATIS

Zone d'activité Est N°1 – B.P. 20

60190 ESTREES SAINT DENIS – France.

Numéro de la D.E. : 14/02/10B 125/265

Date d'approbation de la notice : Janvier 2014.



Information médicale : + 33 (0)1 34 80 72 60